



**“EFECTO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN BASADO EN
REAPRENDIZAJE MOTOR SOBRE LA ORGANIZACIÓN SENSORIAL EN
ADULTOS CON HEMIPARESIA”**

**LEIDY YOHANA APOLINAR JOVEN
LAURA FERNANDA CARDOSO SANTOFIMIO
CLAUDIA MARINA MARIÑO NEIRA**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES
FACULTAD DE SALUD
MAESTRÍA EN NEURORREHABILITACIÓN, COHORTE VIII
MANIZALES
2018**

**“EFECTO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN BASADO EN
REAPRENDIZAJE MOTOR SOBRE LA ORGANIZACIÓN SENSORIAL EN
ADULTOS CON HEMIPARESIA”**

**LEIDY YOHANA APOLINAR JOVEN
LAURA FERNANDA CARDOSO SANTOFIMIO
CLAUDIA MARINA MARIÑO NEIRA**

Informe final de investigación trabajo de grado de Maestría

**CLAUDIA PATRICIA HENAO LEMA, FT. PhD
JULIO ERNESTO PÉREZ PARRA, FT. MsC
MÓNICA YAMILE PINZÓN BERNAL, FT. MsC**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES
FACULTAD DE SALUD
MAESTRÍA EN NEURORREHABILITACÓN, COHORTE VIII
MANIZALES
2018**

AGRADECIMIENTOS

Dedicamos este trabajo a Dios Todo Poderoso. A nuestras amadas familias: madres, padres, hermanos, esposo e hija, quienes nos formaron, dieron todos sus esfuerzos, estuvieron siempre a nuestro lado y nos motivaron para seguir nuestros sueños.

Agradecemos a las personas participantes y sus familias que tomaron la decisión libremente de hacer parte de este proyecto.

A la Universidad Autónoma de Manizales por ser quien nos brindó las herramientas para formarnos como maestrantes.

RESUMEN

Objetivo: Determinar el efecto de un programa de intervención basado en modelo de reaprendizaje motor sobre la organización sensorial en adultos con hemiparesia. **Materiales y métodos:** Se realizó un ensayo clínico cuasi experimental; participaron 69 adultos con hemiparesia, 34 en el grupo control y 35 en el grupo experimental, entre 18 y 60 años de edad. El grupo control recibió un programa de intervención fisioterapéutica convencional y el grupo experimental un programa de intervención fisioterapéutica basado en el modelo de reaprendizaje motor, durante 6 semanas, 3 sesiones/semana. La medición pre test y post test se realizó en ambos grupos utilizando el test de organización sensorial y para el análisis de los datos se usó el software estadístico SPSS. **Resultados:** No hubo diferencias intra muestrales entre el grupo control y el experimental en las primeras tres pruebas del test de organización sensorial. Se evidenció una diferencia significativa en el post-test con respecto al pretest tanto en el grupo control de 0.027, como el grupo experimental de 0.002, únicamente en la cuarta prueba “equilibrio sobre una superficie inestable y ojos cerrados” ($p < 0,05$). En cambio, para las medidas de cambio intermuestrales no hubo diferencias significativas para ninguna de las pruebas del test de organización sensorial entre grupos control y experimental. Esto quiere decir, que tanto el programa de intervención fisioterapéutica convencional como el programa de intervención fisioterapéutica basado en el modelo de reaprendizaje motor mejoran la organización sensorial en personas con hemiparesia. **Conclusiones:** La intervención basada en el modelo de reaprendizaje motor, puede ser un enfoque efectivo dentro de la neurorehabilitación, para mejorar la organización sensorial en el control postural y disminuir la incidencia de caídas durante la realización de actividades funcionales en los adultos con hemiparesia entre 18 y 60 años.

Palabras clave: Paresia, Lesión cerebral, Rehabilitación Neurológica, Retroalimentación Sensorial, balance postural, Evaluación de Resultados de Intervenciones Terapéuticas.

(Fuente: DeCs – BIREME).

ABSTRACT

Objective: to determine the effect of an intervention program based on motor relearning on the sensory orientation of adults affected by hemiparesis. **Materials and Methods:** a clinical trial was performed on 69 adults suffering from hemiparesis; 34 adults in the control group and 35 in the experimental group who range in ages from 18 to 69 years old. For six weeks including three sessions per week, the control group was treated with a conventional physiotherapeutic intervention program and the experimental group was treated with a program based on the motor relearning model. The pre test and post test evaluations were performed in both groups using the sensory organization test and the data analysis was performed with the statistical SPSS software. **Results:** there was no difference between the control group and the experimental group in the first three sessions of the sensory organizational test. There was a significant difference in the post-test with respect to the pre- test as well the 0.027 control group, as the 0.002 experimental group, only in the fourth test, "equilibrium on an unstable surface and closed eyes" ($p < 0.05$). Instead, for the measures of change intermuestral there were no significant differences for any sensory organization test between control and experimental groups. This means, as well the conventional physiotherapeutic intervention program as the physiotherapeutic intervention program based on the motor relearning model improve sensory organization in people with hemiparesis. **Conclusion:** the intervention based on the motor relearning approach could be an effective target in neurorehabilitation in order to improve the sensory orientation, control posture, and decrease the number of falls during functional activities in adults with hemiparesis ages 18 to 69.

KEY WORDS: Paresis, brain injury, neurological rehabilitation, sensory feedback, postural balance, results evaluation of therapeutic interventions.

TABLA DE CONTENIDO

1	PRESENTACION.....	x
2	AREA PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y PROBLEMA	12
2.1	PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.....	19
3	JUSTIFICACIÓN.....	20
3.1	Factibilidad del proyecto	22
4	REFERENTE TEÓRICO.....	24
4.1	REAPREDIZAJE MOTOR EN HEMIPARESIA.....	24
4.1.1	Perspectiva Histórica Del Modelo	24
4.1.2	Modelo de reaprendizaje motor de Carr y Shepherd	26
4.1.3	Desempeño Motor En La Hemiparesia.....	28
4.1.4	El entrenamiento de la sensorialidad y el control postural según el modelo de reaprendizaje motor:	33
4.2	SISTEMA DE CONTROL Y ORGANIZACIÓN SENSORIAL:	35
4.2.1	Generalidades.....	36
4.2.2	Evaluación De La Organización Sensorial.	40
5	OBJETIVOS.....	42
5.1	OBJETIVO GENERAL.....	42

5.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS	42
6	OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	42
6.1	VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS	42
6.2	VARIABLES CLÍNICAS	44
6.3	VARIABLES DE TRABAJO.....	45
6.3.1	Variable Independiente	45
6.3.2	Variables Dependientes:	45
7	6. HIPÓTESIS	46
7.1	HIPÓTESIS NULA ($H_0: \mu_D = 0$)	46
7.2	HIPOTESIS ALTERNATIVAS ($H_i: \mu_D \neq 0$)	46
8	METODOLÓGIA	47
8.1	TIPO DE ESTUDIO	47
8.2	POBLACIÓN	47
8.3	MUESTRA Y MUESTREO.....	47
8.3.1	Criterios De Inclusión Del Estudio:	48
8.3.2	Criterios de exclusión del estudio:	48
9	RESULTADOS.....	50
9.1	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	50

9.2	DIFERENCIA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES PARA LOS PRE-TEST	53
9.3	DIFERENCIA DE MUESTRAS RELACIONADAS (DIFERENCIA ENTRE PRE-TEST Y POST-TEST).....	55
9.4	DIFERENCIA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES PARA LAS MEDIDAS DE CAMBIO PRE-TEST Y POST-TEST	55
10	DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	59
11	CONCLUSIONES.....	63
12	LIMITACIONES.....	64
13	RECOMENDACIONES	65
14	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	66

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. Test de organización sensorial	41
TABLA 2 Estimadores de test de organización sensorial.	48
TABLA 3 Descriptivos de variables cuantitativas y pruebas de normalidad para una muestra	51
TABLA 4 Descriptivos de variable cualitativas (N= 69).....	51
TABLA 5 Descriptivos y pruebas de diferencias inter-muestrales para las medias en el pre-test (variables cuantitativas)	53
TABLA 6 Descriptivos y pruebas de diferencias inter-muestrales para las proporciones en el pre-test (variables cualitativas).....	54
TABLA 7 Organización sensorial. Diferencias intra-muestrales (Muestras relacionadas: pre-test vs post-test).....	55
TABLA 8 Pruebas de normalidad para las medidas de cambio post-test vs pre-test.....	56
TABLA 9 Diferencias inter-muestrales para las medidas de cambio (post-test - pre-test) ..	57

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1 FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE PACIENTES EN INVESTIGACIÓN DEL COMITÉ DE BIOÉTICA UAM.....	73
ANEXO 2 PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE PACIENTES EN INVESTIGACIÓN	76
ANEXO 3 FORMATO ENCUESTA: VARIABLES SOCIO- DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS.....	81
ANEXO 4 FORMATO EVALUACIÓN: TEST DE ORGANIZACIÓN SENSORIAL.....	83
ANEXO 5 MANUAL DE INSTRUCCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.....	84
ANEXO 6 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN: GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL	87

1 PRESENTACION

En el presente informe final del proyecto de investigación denominado “efecto de un programa de intervención basado en reaprendizaje motor sobre la organización sensorial en adultos con hemiparesia” constituye parte del macroproyecto de investigación denominado “efecto de un programa de intervención basado en reaprendizaje motor orientado a la tarea sobre el control postural, la calidad de vida y la discapacidad en adultos con hemiparesia” realizado en el marco de la VIII cohorte de maestría en Neurorehabilitación, previa aprobación por el grupo de investigación cuerpo movimiento en la línea de funcionamiento y discapacidad en la perspectiva de la salud.

Esta investigación es un estudio multicéntrico, donde participaron 69 personas con hemiparesia, entre la edad de 18 a 60 años. Separados en dos grupos: grupo control que recibió tratamiento fisioterapéutico convencional e incluyó el concepto Bobath, Kabat y Brunnstrom; y un grupo experimental que recibió un programa basado en reaprendizaje motor orientado a la tarea, aplicado durante 6 semanas y con 3 sesiones/semana. Los fisioterapeutas estudiantes de la maestría en Neurorehabilitación fueron capacitados para la aplicación del programa de intervención basado en reaprendizaje motor orientado a la tarea, en personas con hemiparesia. Los evaluadores de las fases pre y post intervención, donde se aplicó el test de organización sensorial, fueron fisioterapeutas Magísteres en Neurorehabilitación, graduados de la Universidad Autónoma de Manizales. Los investigadores proponentes del macroproyecto, fueron los directores y coautores de este estudio.

La evaluación y aplicación de los dos programas de intervención se llevó a cabo en las ciudades de Manizales, Pereira, Bogotá, Tunja, Ipiales, Cali, Popayán, Medellín y Barraquilla, durante el periodo de junio a noviembre del año 2017. Durante la aplicación del programa de reaprendizaje motor orientado a la tarea, los usuarios fueron intervenidos por los estudiantes de la maestría tres veces por semana durante 6 semanas consecutivas con un tiempo estimado de 60 minutos por sesión.

Durante el análisis de resultados se evidenció una diferencia significativa en el post-test respecto al pre-test únicamente en el cuatro ítem de la prueba de organización sensorial correspondiente al “equilibrio sobre una superficie inestable y ojos cerrados” ($p < 0,05$), lo que demostró que la intervención basada en el modelo de reaprendizaje motor orientado a la tarea, mejora la organización sensorial en los adultos con hemiparesia entre 18 y 60 años.

2 AREA PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y PROBLEMA

La hemiparesia es el resultado de una alteración de la neurona motora superior, que se manifiesta al lado contrario de la lesión, la cual puede provocar una serie de trastornos motores y sensitivos (1). Dichas consecuencias son producto de diferentes causas como las enfermedades cerebrovasculares que pueden ser de origen trombótico o hemorrágico, el trauma craneoencefálico y en menor caso de patologías neoplásicas, entre otras misceláneas. El daño cerebral adquirido que provoca la hemiparesia es un gran problema de salud pública por el número de personas afectadas, por la duración de sus secuelas que generalmente van a lo largo de toda la vida y por el impacto que éstas generan en la calidad de vida no solamente de la persona sino de sus familias (2).

A nivel internacional, desde el punto de vista neuroepidemiológico, la enfermedad cerebrovascular se considera como la principal causa de hemiparesia y una de las entidades que mayores consecuencias a nivel funcional muestra en las personas que la padecen, lo que la constituye en un problema de salud pública a nivel mundial, generando la primera causa de discapacidad en los adultos y la segunda en demencias (3). De acuerdo al informe del estudio *Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study* (GBD 2010), la enfermedad cerebrovascular, es, además, la segunda causa más común de muerte y la tercera causa más común de discapacidad ajustada en años de vida saludable al 2010, siendo mayor la prevalencia y la incidencia en los países de ingresos medios y bajos (4). De acuerdo a la editorial de *Epidemiología de la Enfermedad Cerebrovascular*, en Estados Unidos se observa un perfil de prevalencia entre 1200 por cada 100 mil habitantes y una incidencia de 200 por cada 100 mil habitantes cada año, con un estimativo de 550 mil nuevos casos cada año, basados en estimativos de raza blanca. Así mismo, según la Organización Panamericana de la Salud (5), el aumento en la magnitud y gravedad del ECV ha sobrepasado todas las expectativas, lo que ha llegado a considerarla como una epidemia, sin embargo a nivel de los países de ingresos medios en Latinoamérica no hay estudios importantes con registros basados en datos epidemiológicos que muestren claramente el perfil del ECV (6).

En relación con la prevalencia de enfermedad neurológica en Colombia, se encontró a través del *Estudio Neuroepidemiológico Nacional (EPINEURO)*, realizado por Pradilla y colaboradores, del Grupo GENECO, en un estudio realizado entre septiembre de 1995 y agosto de 1996, que existe una prevalencia de ECV del 19.9% (IC95%:14.3 a 27.4), siendo mayor en mujeres (7).

De otra parte, en un estudio realizado por Silva, et. Al, en cuanto a la enfermedad cerebrovascular en la población colombiana, se encontró que las muertes por esta causa ocupan el cuarto lugar con gran presencia en los Santanderes y en Antioquia a excepción de Sabaneta, reportando 1027 personas afectadas por cada 100000 habitantes. En Bogotá también se encontró gran concentración de personas con secuelas de ECV con una prevalencia de discapacidad de 1.2%, mostrando un patrón similar al resto del país (8).

Por su parte el traumatismo craneoencefálico representa la primera causa de muerte entre personas de 15 a 45 años y es el primer generador de discapacidad a nivel mundial, provocando una carga de discapacidad cada año, asociada con factores como trastornos motores, comportamentales, emocionales y cognitivos que pueden interferir con la reinserción de las personas al medio social y laboral, así como con la calidad de vida. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 20 y 50 millones de personas en el mundo sufren traumas craneoencefálicos no mortales (9).

La hemiparesia se caracteriza por presentar diferentes alteraciones en los sistemas de acción, lo que suele producir diferentes manifestaciones clínicas relacionadas con las áreas encefálicas lesionadas, siendo las alteraciones de la corteza motora las que están relacionadas con debilidad muscular, presencia de sinergias anormales de las extremidades (10), falta de coactivación y de la movilidad selectiva, así como grandes déficits en el control postural, la cual está relacionada con el riesgo a caer, así como con fracturas de cadera, especialmente en adultos mayores (11).

Las alteraciones del control postural tienen una alta correlación con los aspectos sensoriales y cognitivos; la organización sensorial permite garantizar la orientación espacial y

mantener el equilibrio estático y dinámico en todo momento, mientras que los procesos cognitivos como la atención, parece tener grandes implicaciones sobre los resultados en la tarea (12); por tanto para funciones como la marcha, durante la estancia en bípedo, se encuentra una incapacidad para mantenerse estables y apoyar su lado más afectado, así como mantenerse y responder frente a las perturbaciones del entorno, generando marcada asimetría hacia el lado menos afectado incrementado el desplazamiento en el plano frontal, así mismo, se encuentran importantes desplazamientos del centro de masa durante la estancia en bípedo, generando desviaciones cinemáticas a nivel de la pelvis y de los miembros inferiores, lo que lleva a correcciones exageradas en las estrategias de tobillo, afectando los registros de velocidad, situación que tiene directas implicaciones sobre la realización de actividades en la vida diaria para las actividades en bípedo y durante la marcha (13).

De otra parte, los desplazamientos que requieren cargas de peso como en las transferencias de una posición a otra, se realizan sin una progresión multidireccional como lo refiere la biomecánica funcional, por tanto, éstos se realizan sobre una base de apoyo y un centro de masa inestable, lo que genera una transferencia unidireccional de la carga de peso, con pérdida de la capacidad de apoyo sobre la extremidad parética, lo que genera disminución en la velocidad e imprecisión direccional. Muchas de estas situaciones se deben además a la falta de un adecuado reclutamiento muscular, lo que aumenta el riesgo de caída (11,14).

Las consecuencias a nivel sensoriomotor y las limitaciones en el control postural son probablemente las principales causas de limitaciones en las actividades de la vida diaria y sobre la independencia de las personas, teniendo en cuenta que se considera que biológicamente el control postural es el mayor predictor de independencia funcional y muestra una alta correlación con la calidad de vida de las personas y la percepción de discapacidad en un proceso de rehabilitación (15). A este respecto Carvalho-Pinto y Faria (16) en su estudio sobre discapacidad en un grupo de personas con sintomatología diversa asociada a ECV, reportaron que bajo el modelo de discapacidad de la OMS en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), predominaba el compromiso de la función motora del tipo hemiparesia, la limitación para

realizar ciertas actividades (por problemas en la marcha, el balance, la movilidad funcional, entre otros), diferentes restricciones en la participación social, y una baja percepción en la calidad de vida de las personas. Complementariamente, Murtezani et al, coinciden en afirmar que los elementos asociados a las deficiencias a nivel físico, son los que producen mayor impacto en la interacción social de las personas con hemiplejía post ECV (17).

En una persona con ECV se presentan complejas combinaciones de deficiencias sensoriales, motoras, cognitivas y emocionales, las cuales pueden impedir su capacidad para realizar actividades de la vida diaria de manera independiente. La mayoría de los pacientes con ECV dependen excesivamente de la información visual para controlar su postura tanto en el plano frontal como en el sagital, y tiende a hacerse evidente poco después del evento. Por lo tanto, algunos estudios han sugerido que un programa de rehabilitación que emplea la privación visual para promover el uso de insumos somatosensoriales y vestibulares puede reducir la dependencia visual (69).

Cuando la información sensorial esta alterada, el sistema nervioso central utiliza una entrada sensorial alternativa para la orientación como mecanismo de adaptación. Las aferencias sensoriales visuales que informan sobre el movimiento relativo, entran en conflicto con las entradas tanto somatosensoriales como vestibulares, que se encuentran alteradas y no informan el movimiento de forma correcta. Para resolver este conflicto, el SNC típico ignora la entrada de movimiento visual y se basa en las entradas vestibulares y somatosensoriales de orientación precisa. Sin embargo, en el caso de alteraciones neurológicas, se presenta un conflicto intersensorial a pesar de la disponibilidad de múltiples entradas sensoriales, donde el sistema nervioso generalmente se basa en un solo sentido a la vez para informar la orientación, aumentando el riesgo de caídas en las personas con hemiparesia (61).

En razón a lo expuesto anteriormente, la contribución actual de la Neurorehabilitación en las personas con hemiparesia de cualquier origen es establecer un plan de entrenamiento del control motor basado en la comprensión de la disfunción y las adaptaciones secundarias para el planteamiento de estrategias que permitan la optimización del rendimiento motor en

las acciones funcionales. Por ello, es importante reconocer que las nuevas tendencias de Neurorehabilitación nacen del desarrollo científico y de la búsqueda de la mejor evidencia disponible sobre los aspectos terapéuticos que se deben tener en cuenta durante la intervención. Las principales áreas investigadas hacen referencia al conocimiento de los mecanismos sobre la recuperación o ganancia de habilidades motoras a partir del aprendizaje motor y el ejercicio.

En este sentido, el modelo de Reaprendizaje Motor se considera un enfoque terapéutico que responde a las necesidades actuales, el cual ha basado su trabajo teórico y de investigación en el desarrollo de la ciencia, demostrando sus efectos benéficos en la realización de tareas funcionales o en ciertos casos en el rendimiento funcional. Dicho enfoque, está diseñado en el análisis de cómo adquirir habilidades y destrezas después de la lesión, por tanto, la biomecánica establece un papel fundamental en estas prácticas y el uso de la ciencia y la tecnología por su parte, contribuyen para el mejoramiento y la optimización del desempeño motor en las personas adultas con lesión cerebral.

Desde los años 80`s cuando inicia a establecerse este nuevo enfoque terapéutico, se empieza a evidenciar su efectividad, es así, como un estudio realizado en 1992 de Malouin y colaboradores, con 10 personas con edades entre 60 y 70 años con secuelas de isquemia de arteria cerebral media, que participaron de un programa de entrenamiento en tareas específicas con énfasis en la transición de sedente a bípedo durante 5 semanas, cuyo objetivo era promover la bipedestación y marcha temprana, los resultado mostraron cambios en el tiempo para incorporarse e iniciar la marcha y cambios significativos durante el proceso del programa (15).

En Canadá Teasell, et. al (2009) presentaron las tendencias de rehabilitación en personas con hemiplejía post enfermedad cerebrovascular (ECV), muestran la revolución internacional con relación al entrenamiento de estas personas, especialmente la idea de realizar entrenamientos basados en la tarea, en situaciones de la vida diaria y el entrenamiento intensivo, Se presenta el Modelo de Reaprendizaje Motor como uno de los enfoques de restauración más utilizados, los cuales han mostrado mejor evidencia y

mayores logros en las habilidades motrices. Encontraron en un análisis de 151 estudios, que el entrenamiento en la tarea genera resultados beneficiosos con relación al balance, la marcha, el fortalecimiento de las extremidades paréticas y disminución de los días de hospitalización. Los países estudiados fueron Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Australia con 7429 participantes en total en seis centros de rehabilitación ambulatoria, donde se evaluaron variables como actividades de la vida diaria, marcha con y sin ayudas adaptativas, capacidad de vivir solo, resultados de la evaluación de la FIM (Medida de la independencia funcional), entre otros, a través del *The Post-Stroke Rehabilitation Outcomes Project* (PSROP), estudio multicéntrico prospectivo (18).

Kumar Immadi, et. Al., en 2015 midieron la eficacia del modelo de reaprendizaje motor para promover la función de la extremidad superior después del ECV, en 60 personas en un programa de 8 semanas 6 veces por semana, comparado con terapia convencional, cuyas variables fueron medidas a través de test como el Fulg Meyer Assessment (FMA) y el Test de Función Motora de Wolf (WMFT). Los resultados mostraron en ambos casos diferencias significativas a favor del grupo experimental con relación al grupo control ($p=0,0001$) (19).

Chan en el año 2006, en un ensayo clínico, estudiaron la eficacia del modelo de reaprendizaje motor para promover la función y el desempeño en personas después de la enfermedad cerebrovascular. Este estudio incluyó 52 personas, evidenciando cambios significativos específicamente para las funciones medidas con el *Timed Get up and Go Test* ($p=0.015$). Recomiendan que debe ser un tratamiento secuencial para llegar a los resultados esperados (20).

En un plano más avanzado del relativo al tratamiento sintomatológico y a la recuperación de funciones, se busca que las diferentes intervenciones terapéuticas trasciendan hacia el logro de la mayor funcionalidad de las personas y en este sentido a una menor producción de discapacidad manteniendo en la medida de lo posible, el bienestar y la calidad de vida de las personas. En esta línea de trabajo, estudios como el realizado por Hamzat et al., reportaron como a partir de procesos terapéuticos que generan mejoría de la capacidad

funcional en individuos con hemiplejía post ECV, se disminuye la restricción en la participación social y se potencializa la reintegración a la comunidad (21). Así mismo Murtezani et al., concluyen que los procesos terapéuticos en personas post ECV además de impactar positivamente en su estado físico, producen un incremento en la calidad de vida y en su reintegración en la sociedad.

Rensink, et. Al., en 2009 realizaron una revisión sistemática para proporcionar una visión general de la evidencia en la literatura sobre el entrenamiento orientado a las tareas de los sobrevivientes de enfermedad cerebrovasculares. Realizaron búsquedas en bases de datos como Medline, CINAHL, Embase y la Biblioteca Cochrane de revisiones sistemáticas. Se incluyeron trabajos publicados en inglés entre enero de 1996 y septiembre de 2007, seleccionando 42 artículos en los que se incluyeron ensayos controlados aleatorios seleccionados y las revisiones sistemáticas (70). Esta revisión muestra evidencia importante a favor del entrenamiento orientado a la tarea sobre todas las condiciones del balance, marcha, fuerza, extremidad superior, resistencia cardiovascular y habilidades cognitivas. Con respecto a la variable de equilibrio se encontró que es más efectivo su entrenamiento cuando está relacionado con una tarea específica, se realiza bajo condiciones sensoriales alteradas y deben practicarse como tarea significativa.

Son múltiples los estudios que revelan la efectividad del entrenamiento basado en la propuesta de reaprendizaje motor (22), sin embargo, hasta la fecha y de acuerdo a la literatura rastreada, no se encontraron estudios que muestren el uso del modelo para el tratamiento del adulto con hemiparesia que incluya aspectos integrativos del control postural, la calidad de vida y la discapacidad. De otra parte, es importante destacar que la mayoría de investigaciones a nivel mundial sobre el método son originales de Australia, país donde nació el enfoque terapéutico, con población mayor de 60 años, la mayoría de las veces con enfermedad cerebrovascular. Nuestra investigación se realizó en población colombiana entre 18 y 60 años con hemiparesia de cualquier etiología.

2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

De lo expuesto anteriormente se deriva la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto de un programa de intervención basado en reaprendizaje motor sobre la organización sensorial en adultos con hemiparesia?

3 JUSTIFICACIÓN

El principal interés de este proyecto de investigación fue establecer el efecto de un programa de intervención fisioterapéutica basada en el reaprendizaje motor, sobre la organización sensorial en adultos con hemiparesia. Esta condición motora asociada a diferentes patologías del Sistema Nervioso Central, se constituye hoy en día en un reto para los profesionales de la salud y particularmente para los fisioterapeutas, dadas las alteraciones en el control postural que ocasiona, las cuales interfirieren con la realización de patrones de movimiento tanto de carácter básico (grueso) como selectivo, y dificultando a su vez la ejecución de diferentes actividades tanto de carácter individual como social que desarrollan cotidianamente las personas.

Actualmente existe una tendencia importante en el área de la Neurorehabilitación funcional donde a partir del auge de las teorías del aprendizaje y gracias a los avances en la neurociencia, han tomado fuerza enfoques de intervención en los que las actividades terapéuticas se soportan en tareas relacionadas con la vida diaria, buscando promover la activación de procesos de reorganización cerebral dirigidos a la reeducación y recuperación de las funciones. En este sentido, los modelos de reaprendizaje motor hacen parte hoy en día de propuestas innovadoras que buscan dejar atrás enfoques tradicionales focalizados en el tratamiento de las deficiencias y empeñados en la lucha por aminorar signos positivos asociados a la hemiparesia como es el caso de la espasticidad y los reflejos patológicos. De esta forma, los modelos de reaprendizaje motor orientados a tareas, buscan que, a través de intervenciones citadas, se logren importantes resultados en términos de independencia y autonomía para las personas, que finalmente se espera impacten de manera positiva en la percepción de la discapacidad y de la calidad de vida.

Así mismo, como lo determina la OMS y su clasificación de funcionamiento, discapacidad y salud, los procesos actuales en Neurorehabilitación están enmarcados en paradigmas actuales de intervención basados en nuevos enfoques de control y aprendizaje motor, la cual optimiza la neuroplasticidad a través de la restauración y la recuperación dada a través de un entrenamiento en tarea, procesos todos que buscan mejorar la situación de salud de

las personas y disminuyen la carga de enfermedad existente, tal como lo plantea el plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 del Ministerio de Salud de Colombia.

En este sentido, la investigación se articula a la línea de “Funcionamiento y Discapacidad en la perspectiva de la Salud” del grupo de Investigación Cuerpo Movimiento de la Universidad Autónoma de Manizales (A Colciencias), puesto que se enfoca en fundamentar científicamente un proceso de intervención terapéutico en personas con hemiparesia. Su novedad radica en la insuficiente evidencia disponible respecto al efecto de diferentes enfoques terapéuticos sobre la funcionalidad y en general sobre la vida de las personas con diferentes condiciones de salud. Lo anterior, además de brindar un aporte importante a la Maestría en Neurorehabilitación de la UAM, beneficia en primera medida a las personas objeto de estudio de este trabajo, por el potencial que tiene de aportar a que los procesos de intervención terapéutica en que están inmersos, tengan cada vez mayor soporte científico respecto a su aplicación y posibles resultados.

La evidencia que aporta este estudio respecto a la efectividad de la propuesta terapéutica en términos no sólo funcionales sino a un nivel más amplio, como los aspectos de discapacidad y calidad de vida, brindan una base sólida que permite tomar decisiones en cuanto a su utilización en los procesos de intervención de personas con hemiparesia. En este sentido los resultados de este estudio, además de constituirse en referente para continuar realizando diferentes procesos investigativos en esta área, se convierten en elementos clave para direccionar la planeación, implementación y evaluación de estrategias de intervención en neurorehabilitación que de forma directa pueden incidir en el proceso de rehabilitación integral de esta población. El potencial fortalecimiento de los procesos de evaluación e intervención en neurorehabilitación que se logra a través de este estudio, se constituye en un insumo valioso para la comunidad académica y científica a nivel nacional e internacional interesada en esta área del conocimiento.

Todas las herramientas de evaluación que se utilizaron en este estudio, tienen adecuadas características psicométricas, lo que validó su uso para esta investigación y para su futura aplicación en la evaluación de población con condiciones neurológicas que tengan

asociadas compromiso motor del tipo hemiparesia. La prueba utilizada en esta investigación fue el test de organización sensorial. Este test, consiste en una prueba utilizada para identificar el incremento en el balanceo del cuerpo durante la estancia de pie asociada con alteración visual o de la información de la superficie somatosensorial para el control en bípedo, el cual involucra cuatro aspectos que son: equilibrio sobre superficie plana y ojos abiertos, equilibrio sobre superficie plana y ojos cerrados, equilibrio sobre goma de espuma fomy y ojos abiertos, y equilibrio sobre goma de espuma fomy y ojos cerrados.

3.1 Factibilidad del proyecto

En el transcurso de la investigación no se presentaron elementos desde los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros que hayan obstaculizado su desarrollo. Se reconoce que en algunas ciudades fue difícil la consecución de participantes sobre todo para el grupo control.

La presente investigación se desarrolló como uno de los componentes de un estudio multicéntrico con fisioterapeutas estudiantes de la Maestría en Neurorehabilitación de la UAM, quienes fueron capacitados para la aplicación del programa de intervención en la población objeto de estudio. Participaron como evaluadores de las fases pre y post intervención fisioterapeutas Magísteres en Neurorehabilitación, graduados de la UAM, que fueron entrenados en la aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación que hicieron parte de este estudio. Por su parte, los investigadores proponentes del macroproyecto fueron los directores y coautores de este estudio. Los recursos materiales fueron asumidos por los estudiantes de acuerdo al presupuesto planteado. La capacitación de los evaluadores y el pago de evaluaciones del grupo control fueron asumidos por la UAM.

El presente estudio fue considerado como “investigación con riesgo mayor que el mínimo” de acuerdo al artículo 11 de la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud colombiano por tratarse de la realización de un diseño experimental en personas con

discapacidad (23). La participación en el estudio fue totalmente voluntaria, previa autorización a través de la aceptación y firma de un consentimiento informado (anexo 1). La información recogida se usa solo para fines investigativos preservando los principios de integridad e intimidad de las personas y es tratada confidencialmente y archivada en papel y medio electrónico. El archivo del estudio se guarda en la Universidad Autónoma de Manizales bajo la responsabilidad de los investigadores principales.

Adicionalmente esta investigación cumple con los principios enunciados en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (24), su interés es científico, en todo momento se protegió la integridad de los participantes, se tomaron todas las precauciones del caso para respetar su vida privada y para reducir al mínimo el impacto del estudio en su integridad física y mental.

Por otra parte, se han respetado los derechos de autor de los diferentes insumos teóricos y evaluaciones utilizadas, citando las respectivas referencias bibliográficas. Se aplicaron instrumentos de evaluación con la debida autorización o licenciamiento para su uso en investigaciones científicas.

4 REFERENTE TEÓRICO

4.1 REAPREDIZAJE MOTOR EN HEMIPARESIA

4.1.1 Perspectiva Histórica Del Modelo

La historia de la Fisioterapia Neurológica es un ejemplo de un proceso de cambio que inició desde los años 20 a partir de un enfoque de reeducación muscular y el conocimiento de la anatomía estructural. Estos cambios se dan desde el interés en tratar a personas con Poliomiélitis, a soldados y a personas con secuelas de TEC después de la segunda guerra mundial.

Desde la Neurofacilitación en los años 50, los modelos terapéuticos se centran en el aprovechamiento exclusivo de los aspectos neurofisiológicos, donde métodos terapéuticos se enfocan en procesos estímulo respuesta, estimulación aferente propioceptiva, de los cuales los principales exponentes son los Bobath, Kabat y Knott, Ayres y Brunnstrom (22,25). Por su parte, en los años 80, los modelos terapéuticos antes mencionados hacen mejor apropiación de sus métodos de trabajo y a partir de éstos nacen nuevos enfoques, donde la transferencia del conocimiento teórico científico hacia la práctica con personas con lesión neurológica se fundamenta en los actuales conocimientos sobre control y aprendizaje Motor y sobre como adquirir habilidades y destrezas después de la lesión, por tanto la biomecánica establece un papel fundamental en estas prácticas y el uso de la ciencia y la tecnología por su parte, contribuyen para el mejoramiento y la optimización del desempeño motor en las personas adultas con lesión cerebral, especialmente a consecuencia de un ECV o de un TEC (26).

Así mismo, congruente con el surgimiento de las nuevas tendencias terapéuticas y la introducción de la tecnología para el entrenamiento de las personas, aparecen grandes avances en los estudios de la neurociencia y la medicina basada en la evidencia. Por tanto, desde la perspectiva histórica, se muestra que existe un importante salto desde las teorías de control y aprendizaje motor desde un componente científico, hacia el componente clínico – terapéutico, donde uno de los ejes fundamentales es la evaluación y el reconocimiento de los efectos en la persona de la actividad terapéutica, en términos de funcionalidad y

limitación. Por tanto, hay nuevos enfoques igualmente para los procesos de medición y evaluación del individuo con lesión de neurona motora superior desde aspectos como la evaluación de la debilidad muscular y la movilidad selectiva, los cambios adaptativos de los músculos como aumento de la tensión consecuencia de la espasticidad y lo referente con el manejo clínico (27).

Según esto, el concepto de manejo de la espasticidad decrece frente al entrenamiento en función, a través de la promoción de la fuerza muscular y, por ende, la disminución de la debilidad muscular de las estructuras comprometidas para promover la destreza de acuerdo al trastorno del control motor presente (28). Adicionalmente, se ha implementado el trabajo sobre las estructuras de tejido blando, las cuales se ven comprometidas como consecuencia de la debilidad muscular y la ineffectividad después de la lesión. Estas adaptaciones incluyen tensión muscular y a la reorganización estructural y funcional del músculo y tejido conectivo, por tanto, las nuevas tendencias de intervención fisioterapéutica para el área de la Neurorehabilitación emergen del gran desarrollo del conocimiento científico y a la búsqueda de la mejor evidencia disponible sobre los aspectos terapéuticos que se deben tener en cuenta durante la intervención. En este sentido, las principales áreas investigadas hacen referencia al conocimiento de los mecanismos del control motor, biología muscular, biomecánica, la adquisición de las habilidades motoras a partir del aprendizaje motor y el ejercicio, el cual, aparece gracias a la necesidad específica de realizar una tarea en un contexto específico a través del desarrollo de la fuerza muscular que debe presentarse de acuerdo a las necesidades (29,30).

De otra parte, la evidencia sugiere que se debe utilizar desde el comienzo la extremidad afectada e involucrar en su proceso de tratamiento el ejercicio para el mejoramiento de la fuerza muscular, por tanto para que el funcionamiento sea adecuado desde el comienzo y con una alineación adecuada, los nuevos enfoques de control motor buscan la adaptación de elementos tecnológicos, la adaptación temprana al entrenamiento, el uso de la extremidad más afectada, la bipedestación pronta, con el uso además de la tecnología de punta.

Finalmente, la optimización del desempeño motor está directamente correlacionada con la reorganización neural y la recuperación funcional, lo que significa que una terapia de inicio temprano es mucho más efectiva; así, la evidencia ha demostrado que un entrenamiento basado en una práctica orientada a una tarea y el entrenamiento motor fundamentados en el trabajo sobre la fuerza muscular y la capacidad aeróbica, son los aspectos que con mayor tendencia aumentan el aprendizaje motor y la optimización del desempeño funcional (31).

4.1.2 Modelo de reaprendizaje motor de Carr y Shepherd

El modelo de reaprendizaje motor es un proceso de entrenamiento basado en resultados de investigación acerca del desempeño motor y el aprendizaje motor de cara a facilitar la participación de la persona en su recuperación, el cual tiene fundamento en la neurofisiología y arduos resultados en investigaciones sobre biomecánica humana y la aplicación de ésta al análisis de las habilidades motoras. Sin embargo, el modelo terapéutico igualmente está fundamentado en teorías conductistas como las de Peto, el cual se basaba en principios de acondicionamiento y su relación con aspectos neurofisiológicos y a la información neuropsicológica.

El modelo de reaprendizaje motor es un modelo de rehabilitación inicialmente propuesto para personas después del ECV, cuya mayor concepción es el reconocimiento de la capacidad que tiene el cerebro de recuperarse y cuya adaptación puede ser influenciada positiva o negativamente, además por el contexto que rodea el individuo, el cual genera gran influencia por la recuperación; es por ello que se plantea un programa de rehabilitación que busque el entrenamiento que implique la práctica y la experiencia, que es de lo que se aprenderá.

Los resultados de la investigación realizada por Carr y Shepherd se denominaron hacia la ciencia del movimiento (32), dando lugar al cuerpo de conocimientos importante para el entrenamiento del rendimiento motor, la biomecánica, la cual permite describir las características de las acciones, la función muscular y el papel que juegan las articulaciones durante las actividades. Así mismo, se tiene en cuenta el proceso de aprendizaje motor y

todos los aspectos de la psicología cognitiva como son los procesos de motivación, atención y la relación entre la intención y la acción, por tanto la base de la práctica terapéutica se fundamenta en estrategias de trabajo sobre las reacciones posturales en un contexto real de aprendizaje en situaciones de la vida diaria, teniendo en cuenta la actividad muscular la cual es diferente para cada individuo y de acuerdo al contexto en donde se ejerza (33).

Este modelo de reaprendizaje motor por tanto se fundamenta como ya se expresó, en la ciencia del movimiento, la neurofisiología y la teoría del aprendizaje, cuyo objetivo se centra en enseñar a las personas estrategias para poder conseguir una meta en un movimiento útil funcionalmente, por tanto, una de las bases fundamentales es entrenar poniendo en escena los aspectos cognitivos en de la práctica y con la repetición constante de una tarea (32). Desde el surgimiento de este concepto de entrenamiento especialmente originado por Janet Carr, se dio importancia a fundamentar el conocimiento y la práctica en la investigación y en la evidencia científica, consolidar unas bases teóricas más fuertes que permitieran fundamentar la intervención, así como estar a la vanguardia de los cambios de la época, bajo un paradigma de partir de una evaluación clara y objetivable, con la comprensión de los procesos de reaprendizaje de una habilidad motora (34).

Es importante en este modelo terapéutico destacar que el objetivo es optimizar las habilidades motoras tras sufrir el daño, para lo cual es importante la activación emergente de la fuerza muscular, no contemplar que siempre en el adulto la recuperación funcional se da en un patrón proximal distal, pues no existe evidencia que sea exclusivo iniciar con un entrenamiento proximal para mejorar la función de las extremidades, por el contrario muchas investigaciones han mostrado que entrenamientos de distal a proximal como para el caso de entrenamientos en agarre y manipulación, pueden mejorar la función distal tras el proceso, la hipertonia no siempre es un proceso neural centrado en el tono, ésta puede ser de tipo no neural dada por el acortamiento y los cambios en las estructuras blandas del cuerpo (35,36).

Es un enfoque además que hace una correlación entre un entrenamiento basado en un aprendizaje musculoesquelético y el entrenamiento en actividades de la vida cotidiana, por tanto, se enfoca el entrenamiento en la adquisición de habilidades críticas, donde el fisioterapeuta toma el papel de entrenador, guiando los movimientos y las actividades de las personas, a través de un programa de mejora en la fuerza muscular (37).

En este sentido, es importante tener en cuenta, que el modelo de reaprendizaje motor en la actualidad se utiliza para trabajar con personas con cualquier desorden del SNC, su base de aprovechamiento es el aprendizaje motor y la biomecánica, el objetivo central es reeducación en todas las actividades de la vida diaria y cuyos conceptos de tratamiento son la neuroplasticidad, reconocimiento de los modelos actuales de control motor, recuperación de los sistemas lesionados, evitar las compensaciones, el tono anormal no es la clave del entrenamiento, éste se realiza sobre los componentes perdidos de una tarea en una práctica específica y cuya estrategia es el entrenamiento muscular y mantener la elongación; se hace énfasis además en un entrenamiento cognitivo (hand off) y promueve la práctica fuera de la sesión de fisioterapia (37).

4.1.3 Desempeño Motor En La Hemiparesia

Las prácticas fisioterapéuticas pioneras en establecer el uso de la activación muscular, el incremento de la fuerza y la velocidad en la contracción muscular fueron las de Carr y Shepherd, quienes promovieron unos cambios radicales en el aprovechamiento de la rehabilitación neurológica a partir de 1982. En este sentido, mientras otros modelos terapéuticos basaban su práctica en el conocimiento del desarrollo de los patrones de movimiento y hacían énfasis en el control postural, la estabilidad y la reeducación del tono muscular anormal, como el aspecto más importante, Carr y Shepherd desarrollaban el modelo de reaprendizaje motor el cual consideraba el control motor como clave en la contribución de la función con tendencia a la eliminación de la actividad muscular innecesaria, la práctica y la retroalimentación (38).

Este nuevo enfoque abre la brecha hacia nuevos procesos y prácticas en Neurorehabilitación y establece la importancia del rol que cumple el entrenamiento muscular para la recuperación de la función de manera tal que categoriza su práctica en dos momentos:

Alto nivel de entrenamiento para prevenir que la deficiencia se convierta en una discapacidad.

Bajo nivel de entrenamiento para reducir la discapacidad.

El fortalecimiento muscular se ha considerado como un problema importante a resolver para el manejo de la persona con condiciones neurológicas, sobre todo después del ECV solo en los últimos años, debido a que la tendencia era siempre un trabajo que giraba alrededor de la reducción de la espasticidad. En este caso, las recientes investigaciones han mostrado que las personas después del ECV son débiles durante las contracciones isométricas y parece ser que los músculos distales se debilitan más que los proximales, los flexores más que los extensores, para lo cual además se tiene que tener en cuenta el tipo de tarea, la edad y el género (39).

La evidencia sugiere que la fuerza muscular no se recupera espontáneamente cuando se incrementa la actividad, por lo tanto, en el proceso de rehabilitación deben existir procedimientos directamente dirigidos al aumento de la fuerza muscular. Así mismo, las investigaciones muestran que la atrofia muscular no se produce por desuso, por el contrario, en la primera semana después del evento causante de la hemiparesia como puede ser el ECV, hay debilidad, inclusive en el lado no parético; así como los músculos acortados, no son fuertes, por el contrario, además de la disminución de la longitud del músculo hay marcada debilidad (40).

En este sentido, para el entrenamiento de la fuerza muscular se deben tener en cuenta los siguientes puntos clave como son:

El entrenamiento de la fuerza muscular se debe hacer teniendo una adecuada estabilidad postural.

Incrementar la fuerza muscular a través de la resistencia con contracciones isotónicas e isométricas.

Realizar preferiblemente contracciones excéntricas, ya que estas producen más fuerza, tienen mayor ventaja mecánica y menos costo metabólico que las concéntricas.

Por su parte, el entrenamiento muscular debe realizarse en tareas específicas y requiere estimulación y retroalimentación sensorial, sin embargo, no hay ninguna evidencia de que los estímulos habitualmente usados por algunos modelos terapéuticos como el uso de cepilleo, golpeteo aproximaciones articulares o hasta el uso del hielo, generen algún cambio funcional; lo que se ha encontrado a través de muchas investigaciones es que el conocimiento del entorno y el entendimiento o comprensión de los actos motores guiados no se da solo con la estimulación sensorial que comprometa piel, laberinto, músculos, visión y audición, sino que involucre además procesos de atención, y de memoria como elementos clave necesarios para el aprendizaje motor. Vale la pena recalcar, por tanto, que este enfoque de intervención privilegia un adecuado estado de conciencia y una capacidad de atención que por lo menos le permita entender que es lo que se está haciendo.

Es así, como las implicaciones del entrenamiento muscular en la Neurorehabilitación se relacionan con:

Mejora de la fuerza muscular.

Disminución de la actividad espinal involuntaria.

Incremento de la adaptación neural.

Activa la inhibición recíproca.

Modifica los rangos de movilidad articular.

Mejora la coordinación y la activación muscular.

Incrementa la extensibilidad y disminuye la tensión muscular.

Los tipos de ejercicios recomendados según la evidencia para personas con hemiparesia son ejercicios de gradación repetitiva del grupo muscular, realización de la misma actividad involucrando tareas, incrementando el grado de dificultad, incluyendo aspectos de la estabilidad y generando tareas complejas o dobles (dual task), práctica y repetición constante e implosión de estímulos.

Con relación a las contracciones musculares, no hay evidencia de que el trabajo de co-contracción tenga un efecto adecuado, sobre los resultados del entrenamiento, así mismo, no hay diferencia entre la contracción entre músculos flexores y extensores. Por su parte, las contracciones dinámicas o durante la actividad, a través de diferentes investigaciones, no han mostrado que incremente la espasticidad. En este sentido, es claro que la espasticidad se manifiesta como un fenómeno dependiente de la velocidad, lo que claramente ha mostrado en anteriores postulados que este fenómeno deteriora la generación de la fuerza muscular y la velocidad, y permite reconocer que los sujetos sanos tienen mayor número de contracciones dinámicas y más tendencia a aumentar la velocidad, por tanto la espasticidad si impide la generación de la fuerza especialmente en contracciones de alta velocidad, no el aspecto contrario, donde se pensaba que el trabajo de entrenamiento muscular aumentaba la espasticidad. Es claro, que la evidencia ha mostrado que no hay aumento de la hiperactividad del reflejo de estiramiento con el entrenamiento de la fuerza ni con contracciones isométricas, ni dinámicas, ni trabajo isocinético, así como tampoco hay inconveniente con el trabajo en contra de la gravedad (41).

Con relación al tono muscular, es importante reconocer que hoy día no es primordial el trabajo hacia la recuperación del tono y por tanto la rehabilitación no debe centrarse en este fenómeno. Así mismo, es importante, saber la diferencia existente entre la espasticidad e hipertonía, pues la espasticidad es ampliamente reconocida como un trastorno velocidad dependiente de la actividad del reflejo de estiramiento como resultado de la hiperexcitabilidad de la motoneurona (42), mientras que la hipertonía es un aumento de la resistencia pasiva, la cual no solo se ve afectada por el reflejo de estiramiento, por tanto, puede ser de origen neural o no neural.

Estudios han encontrado que en personas con hemiparesia hay un importante proceso de contribución al aumento de la hipertonia provocada por la tensión de los tejidos blandos, acortamiento de los nervios periféricos, lo que no está asociado a una hiperactividad de la respuesta EMG. Las investigaciones realizadas hasta la fecha han encontrado que los cambios no neurales se deben a una proliferación del colágeno y remodelación anormal del material no contráctil, aumento de los puentes cruzados de actina y miocina, lo que parece genera un cierre en la contracción del músculo periférico (43,44).

Después de la lesión cerebral es común encontrar disminución del reclutamiento de unidades motoras la cual, asociado a la debilidad, la afectación de la contracción y la disminución de la velocidad afectan directamente la potencia, por tanto, en el proceso de entrenamiento de la persona en pro de un beneficio funcional es mejorar al mismo tiempo que la fuerza la velocidad. Así mismo, hay una relación de pérdida de la movilidad del ángulo de desplazamiento como consecuencia de estas deficiencias entre la relación del tiempo de contracción y la relajación y por su puesto la articulación empieza a afectarse.

Por tanto el entrenamiento es necesario después de la lesión para la generación de la fuerza y mejorar la efectividad de los músculos debilitados y para mejorar el desempeño funcional, factores que están influenciados por aspectos como la talla y el peso del individuo (fuerza relativa en oposición), por tanto se debe tener en cuenta que cada músculo implicado en una acción ha de generar un pico fuerza a la longitud apropiada, fuerza que tiene que ser gradual y sincronizada de tal manera que la actividad muscular sinérgica esté regulada para la tarea y por el contexto. La fuerza debe entrenarse durante tiempo suficiente e ir incrementándose para facilitar las exigencias del entorno, así como aumentar la velocidad (31).

4.1.4 El entrenamiento de la sensorialidad y el control postural según el modelo de reaprendizaje motor:

De acuerdo con Shumway-Cook y Horak (61), el sistema de control postural está constituido por un sistema de aferencias sensoriales que informan sobre el balanceo del cuerpo y éste a su vez proporciona un mecanismo de compensación sensorial, es decir, brindan información sobre la posición del cuerpo, donde el sistema visual, vestibular y somatosensorial, son los principales contribuyentes al equilibrio.

La disminución de la capacidad para mantener el equilibrio estático y dinámico después de la enfermedad cerebrovascular podría estar relacionada con la incapacidad de seleccionar información sensorial confiable (sistema visual, vestibular y somatosensorial) para producir la acción motora adecuada necesaria para mantener la estabilidad postural (65). Esto se ve reflejado cuando se manipulan los aportes sensoriales de los sistemas visual, vestibular y somatosensorial en las personas con ECV y muestran una mayor inestabilidad postural comparada con las personas sanas (72). Esto pueden incurrir en déficits en el control del equilibrio durante las perturbaciones esperadas e inesperadas, los ajustes posturales voluntarios o los ajustes posturales que preceden a los movimientos voluntarios de las extremidades, aumentando el riesgo de caídas y el temor subsiguiente a caerse. (65).

Dado que las personas con enfermedad cerebrovascular a menudo presentan déficits somatosensoriales, la adaptación de ejercicios regulares con el uso de la manipulación de la superficie y la visión para desafiar el equilibrio podría mejorar el proceso de integración somatosensorial y tienen un efecto positivo sobre la estabilidad postural. Este tipo de intervención también ha demostrado ser eficaz para mejorar la estabilidad postural en personas sin alteraciones neurológicas (73).

Por lo tanto, los Objetivos de la Neurorehabilitación son proporcionar oportunidades a un individuo para recuperar o mejorar la función con adecuada destreza en acciones funcionales e incrementar los niveles de fuerza, resistencia y condición física. La destreza para realizar una tarea motora aumenta en función de la cantidad y del tipo de práctica, en

cuanto al manejo del tiempo. Estudios observacionales han demostrado que el proceso de rehabilitación debe ser por sí solo efectivo, sí al incrementar la cantidad de tiempo empleado practicando, mejora el resultado y existe cada vez más evidencia de que métodos pueden ser efectivos. En este sentido, el proceso de rehabilitación no necesariamente debe estar combinado con otro tipo de actividad física o terapéutica, sino que por sí solo debe demostrar la recuperación y el logro de objetivos en las personas.

De otra parte, el entrenamiento de rehabilitación siguiendo los modelos de reaprendizaje motor o de entrenamiento orientado en la tarea han variado donde el realizar actividades grupales ha demostrado mejor participación de las personas, incremento de los ánimos y hay suficiente evidencia de que las clases de ejercicios y entrenamientos en circuitos pueden ser factibles y eficaces. El realizar actividades en circuitos supervisados por el fisioterapeuta compromete a la persona a su propio proceso de recuperación, genera un sentido de responsabilidad y permite adquirir cierto control sobre los efectos que afectan sus vidas (45). Los efectos beneficiosos de estos programas incluyen no solamente respuestas fisiológicas mejoradas sino también un rendimiento funcional motor mejorado.

Maneras simples de incrementar la tolerancia al ejercicio y la resistencia, incluso en estadios tempranos desde un VO₂max del 30 al 40% aumentando a partir de 30 minutos/3 veces por semana, pueden incluir marcar objetivos como incrementar la velocidad del movimiento y el número de repeticiones, aumentar la carga y la respuesta al trabajo. Estos resultados pueden llevarse a un gráfico explicativo para la persona proporcionándole una retroalimentación y motivación.

Es así, como la utilización de un modelo de entrenamiento orientado en la tarea para mejorar el balance debe centrarse en los objetivos de los procesos de control y aprendizaje motor. En este sentido, la teoría del control motor que soporta el modelo de entrenamiento orientado en tareas fundamenta que el problema mecánico de permanecer en el equilibrio según nos movemos es un reto fundamentalmente para el sistema nervioso central, el cual se encarga de realizar un conjunto de ajustes necesarios para mantener una postura y para moverse el cual cumple unos objetivos como soportar el cuerpo contra la gravedad y otras

fuerzas externas, mantener el centro de masa corporal alineado y equilibrado sobre la base de apoyo y estabilizar partes del cuerpo mientras se mueven otras partes.

Por tanto, como recomendaciones para el entrenamiento del balance es importante tener en cuenta que no puede haber entrenamientos del equilibrio de manera aislada de las acciones que deben volverse a aprender. En este sentido el enfoque de entrenamiento se debe basar en tareas concretas basadas en situaciones cotidianas, en el entrenamiento de andar, levantarse y sentarse, alcanzar objetos y manipulación, también se entrenan los ajustes posturales, ya que la adquisición de destreza implica en gran parte el ajustamiento fino del control postural y del equilibrio. Los ajustes posturales son específicos de cada acción y condiciones en que ocurren (46).

Cuando los requerimientos de entrenamiento orientado en la tarea requieren específicamente involucrar el control axial, este debe basarse en actividades relacionadas con la función del tronco donde se pueden realizar ejercicios de equilibrio sentado y en bípedo, ejercicios de rotación y troncopedales generales.

En la misma línea es importante tener en cuenta que para un entrenamiento basado en la prevención de las caídas el ejercicio debe hacer cambios en los grados de dificultad y comenzar desde cadenas cinéticas cerradas hacia cadenas cinéticas abiertas, pasando por las modificadas; iniciando el trabajo dentro de los límites de la estabilidad para avanzar el trabajo fuera de los límites, con contracciones concéntricas hacia contracciones excéntricas. El ejercicio debe tener una dosificación adecuada donde se debe iniciar con sesiones de 30 minutos, iniciando y terminando con periodos de calentamiento y vuelta a la calma (31).

4.2 SISTEMA DE CONTROL Y ORGANIZACIÓN SENSORIAL:

Pese a que no existe una única definición de control postural y no hay aún un consenso sobre los mecanismos neurales que subyacen a su control (47), se sabe que el control postural emerge de la interacción del individuo con la tarea, el ambiente y la habilidad de mantener una adecuada posición de cada uno de las partes del cuerpo en el espacio. Emerge

de la completa interacción de los sistemas musculoesquelético y neurológico, lo que hace referencia al control postural (48).

4.2.1 Generalidades

El control postural involucra el control de las posiciones del cuerpo en el espacio y la capacidad de mantener una adecuada relación entre los segmentos corporales y la relación con el espacio y la tarea (49,50). El término control postural incluye la relación entre el componente biomecánico y el neural para el mantenimiento de la estabilidad postural, lo cual requiere gran actividad de receptores sensoriales, manejo de la gravedad y la influencia vestibular, la base de soporte y la relación del cuerpo con los objetos y el espacio.

Es la capacidad de mantener el equilibrio en un campo gravitacional y de tener el centro de masa corporal dentro de la base de apoyo. En este sentido es importante reconocer que los seres humanos son inestables y no obstante requieren constantemente contrarrestar las fuerzas desestabilizantes que afectan el equilibrio a través de una constante energía muscular que permite con unos pocos grados de movilidad producir rangos imperceptibles de desplazamiento que facilitan los ajustes posturales necesarios para evitar la alteración del control postural (51).

Según Massion el sistema de control postural tiene dos funciones principales: primero, construir la postura contra la gravedad y asegurar que se mantenga el equilibrio; segundo, fijar la **orientación** y la posición de los segmentos que sirven de marco de referencia para la percepción y la acción con respecto al mundo exterior. Esta doble función del control postural se basa en cuatro componentes: los valores de referencia, como la orientación de los segmentos corporales y la posición del centro de gravedad (una representación interna del cuerpo o esquema del cuerpo postural); los elementos multisensoriales que regulan la orientación y la estabilización de los segmentos corporales; y las reacciones posturales anticipatorias (APAS) para la recuperación del equilibrio después de la perturbación, o estabilización postural durante el movimiento voluntario, que sirven para mantener la estabilidad postural y compensar las fuerzas desestabilizadoras asociadas con el

movimiento de una extremidad (52). Los APAS, son elementos constitutivos muy importantes del sistema de control postural, los cuales también se pueden denominar como anticipación, y pueden ser preparatorios o de acompañamiento, ocurren antes y durante el movimiento. Los APAS preparatorios (Papas), se dan previos al movimiento voluntario de las extremidades, mantienen la estabilidad postural, a través de la adaptación frente a las fuerzas desestabilizadoras (53).

De otra parte, según Pollock et al, el control postural se define como el acto de mantener, lograr o restaurar un estado de equilibrio durante cualquier postura o actividad y cuyas estrategias pueden ser predictivas o reactivas, y pueden implicar una respuesta de soporte fijo o una respuesta de cambio de soporte (54).

El control postural en la actualidad, no se considera como la suma de reflejos estáticos sino como una actividad compleja dada por la interacción de múltiples procesos dinámicos cuyo principal objetivo son el equilibrio y la organización sensorial; el equilibrio implica la orientación activa del tronco y la cabeza con respecto a la gravedad, el soporte en diferentes tipos de superficies, el entorno visual y las referencias internas, cuya información sensorial depende de los sistemas somatosensorial, vestibular y visual, respuestas que dependen de la demanda de la tarea y del movimiento en un contexto real. Por otro lado, el equilibrio implica la coordinación de estrategias de movimiento para estabilizar el centro de masa corporal (CMC), durante las perturbaciones de la estabilidad tanto auto iniciadas como activadas extrínsecamente que dependen no solo del desplazamiento postural externo sino de las expectativas del individuo y la experiencia previa (49).


El control postural, por su parte, requiere de dos elementos importantes para su establecimiento que son la acción ejercida por la fuerza de gravedad, la cual genera sobre los cuerpos estacionarios una demanda alta para mantenerse estables y erectos, pese a tener una base de soporte (BOS) pequeña como en el caso de los humanos durante la bipedestación y por otro lado, el control postural requiere una activación de reacciones anti-gravitacionales necesarias para contrarrestar la fuerza de la gravedad y generar ajustes

frente a las alteraciones de la proyección del centro de masa corporal y su reacción de carga al piso (55).

Así mismo de acuerdo a lo reportado por Horak, para el procesamiento del control postural, es necesario una cantidad de aspectos de la cognición, lo que hace muy compleja la estructura fisiológica del control postural debido a la implicación de muchos sistemas subyacentes para mantener la capacidad de que el individuo permanezca estable. Así mismo, para la autora, el sistema de Control postural consta de muchos componentes, así como de estrategias compensatorias que las personas pueden utilizar para funcionar sobre una base de equilibrio, por lo cual es necesario reconocer la importancia del trabajo del SNC para controlar esta función.

Adicionalmente se deben contemplar otros sistemas fisiológicos que le permiten a una persona por ejemplo estar de pie, caminar e interactuar con el entorno, lo que significa que mientras un subsistema es actuante el otro está haciendo un importante aporte para dar lugar a la estabilidad postural.

FIGURA 1. Requerimientos para el Control Postural



Tomado y adoptado de Horak FB, 2006 (49).

En el anterior gráfico se muestran los recursos necesarios para la estabilidad postural y la organización sensorial, los cuales pueden ser alterados generando aumento de la incidencia de caídas en las personas de edad avanzada o con alguna condición especialmente de carácter neurológico (49). Los puntos clave en cuanto al control postural para Horak son:

El control postural es un complejo motor de habilidades basadas en la interacción dinámica de procesos sensoriomotores.

La función del balance depende de las estrategias que los individuos utilizan para lograr una determinada tarea.

Un daño a los diferentes sistemas del control postural resulta en diferentes alteraciones del equilibrio.

Un proceso de evaluación y de rehabilitación de los trastornos del equilibrio requiere una comprensión y abordaje de múltiples sistemas sensoriales que subyacen al control postural.

La información sensorial para el control postural viene según Horak, en su artículo *Postural strategies associated with somatosensory and vestibular loss (1990)* de por lo menos tres fuentes de información que son el sistema somatosensorial incluidos la propiocepción muscular, articular y cutánea, el sistema vestibular y la visión. La información de estas tres fuentes parece ser a encargada de mantener la estabilidad postural, sin embargo, en varias observaciones clínicas citadas, se informa que la integración de múltiples sistemas son las necesarias para mantener el equilibrio (56).

En este sentido, los roles relativos de los **sistemas somatosensorial, vestibular y las entradas visuales para la organización sensorial y el equilibrio**, pueden cambiar dependiendo de la tarea y en función del contexto ambiental particular (49). De esta forma, el sistema visual contribuye a la orientación espacial y la percepción de automoción, aportando datos acerca de la estructura tridimensional del entorno, siendo importante la iluminación del mismo, la complejidad de sus componentes, y la adaptación. La estimulación visual puede ser foveal y voluntaria (seguimiento lento) o retiniana y no

voluntaria (sistema optocinético). Ambos sistemas discurren por diferentes vías con el único objetivo de estabilizar la mirada (71). Cambios en el entorno visual puede provocar alteraciones del equilibrio y caídas en personas con hemiparesia.

Así mismo, las entradas vestibulares detectan la aceleración de la cabeza en un marco de referencia gravitoinercial, mientras que los propioceptores del cuello proporcionan información sobre la cabeza en relación con el tronco. Por lo tanto, la combinación de entradas vestibulares y de cuello permite al sistema derivar la posición y la velocidad del tronco en relación con el entorno (49).

Finalmente, los aferentes somatosensoriales, que incluyen mecanorreceptores en la piel, receptores de presión en tejidos profundos, husos musculares, órganos del tendón de Golgi y receptores de articulaciones, proporcionan información crítica sobre la postura (49).

4.2.2 Evaluación De La Organización Sensorial.

El déficit del balance en las personas con hemiplejia es uno de los problemas más comunes que se debe tener en cuenta en Neurorehabilitación a la hora del examen, con el fin de identificar sobre cuál de los elementos del control postural está relacionada la alteración y que tipo de test y medidas va a utilizar con el fin de identificar plenamente la alteración y que planes de trabajo se podrán plantear de acuerdo a los resultados (58).

En la presente investigación se espera centrar los procesos de evaluación del control postural en los planteamientos realizados por Horak y Wollacott, donde se muestra un enfoque integral de sistemas de cara a la evaluación de las personas con condiciones neurológicas. En este sentido, en el proceso se espera evaluar la organización sensorial, la

estabilidad durante la marcha y el control postural antigraavitatorio, elementos que hacen parte de la propuesta de Horak de los elementos o componentes de la evaluación del control postural (51).

El test de organización sensorial es un test desarrollado por Horak et al., este test da información sobre la actividad de los sistemas sensoriales que determinan la organización sensorial y la estabilidad dada a través de las estrategias posturales para mantener la restauración y el balance. En esta prueba se incluye cuatro ítems donde se integra las actividades con estímulos visuales y sin estímulos en un tiempo de 30 segundos cada ítem, sobre superficie estable e inestable. Su tiempo de aplicación es de 5 minutos que tiene en cuenta la habilidad del sistema vestibular y visual de mantener la postura y la orientación frente a las condiciones desensibilizantes. (60)

TABLA 1. Test de organización sensorial

Test de romberg sobre superficie plana y ojos abiertos.	Test de romberg sobre superficie plana con ojos cerrados.	Test de romberg sobre goma de espuma de Fomy y ojos abiertos.	Test de romberg sobre goma de espuma de Fomy y ojos cerrados.
(3) 30 seg. Estable	(3) 30 seg. Estable	(3) 30 seg. Estable	(3) 30 seg. Estable
(2) 30 seg. Inestable	(2) 30 seg. Inestable	(2) 30 seg. Inestable	(2) 30 seg. Inestable
(1) menos de 30 seg.	(1) menos de 30 seg.	(1) menos de 30 seg.	(1) menos de 30 seg.
(0) Incapaz	(0) Incapaz	(0) Incapaz	(0) Incapaz

H, C. (1993). A study of the clinical test of sensory interaction and balance. Houston, TX 77030.

5 OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer el efecto de un programa de intervención basado en reaprendizaje motor sobre la organización sensorial en adultos con hemiparesia.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Caracterizar la población de estudio en cuanto variables socio demográficas y clínicas.

Determinar el nivel de organización sensorial en adultos con hemiparesia antes de la aplicación del programa intervención.

Determinar el nivel de organización sensorial en adultos con hemiparesia después de la aplicación del programa intervención.

Determinar las diferencias intra-muestrales en el nivel de organización sensorial en adultos con hemiparesia, tanto para el grupo que recibió el programa intervención basado en reaprendizaje motor, como en el que recibió un programa de intervención convencional.

Determinar las diferencias inter-muestrales en la medida de cambio en el nivel de organización sensorial en adultos con hemiparesia, entre los grupos que recibieron el programa de intervención basado en reaprendizaje motor y el que recibió intervención convencional.

6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

6.1 VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Variable	Valor	Descripción	U. Medida
Edad	Entre 18 y 60	Tiempo que una persona ha vivido desde su nacimiento a la fecha de la evaluación.	Años
Sexo	Femenino	Condición de ser hombre o mujer, determinado por características biológicas: anatómicas, y fisiológicas.	0
	Masculino		1
Estado civil	Soltero	El estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley (Decreto 1260 de 1970, Artículo 1, Ministerio de Justicia – Colombia)	1
	Casado		2
	Divorciado		3
	Viudo		4
	Unión libre		5
	Otro		9
Años de escolaridad	0 – 30	Cantidad de años de educación formal aprobados	Años
Situación laboral	Empleado	Ocupación actual: trabajo, empleo u oficio.	1
	Independiente		2
	Estudiante		4
	Jubilado		5
	Pensionado por invalidez		6
	Desempleado (por la condición de salud)		7
	Desempleado (por otras causas)		9
	Otro		
Estrato socioeconómico	Estrato 1 o Bajo-bajo Estrato 2 o Bajo	Nivel de clasificación de un inmueble como resultado del proceso de estratificación socioeconómica. Legalmente existe un máximo de seis estratos socioeconómicos. (Artículo 102 Ley 142 de 1994).	1
	Estrato 3 o Medio-bajo Estrato 4 o Medio		2
	Estrato 5 o Medio-alto Estrato 6 o Alto		3
			4
	Otro: rural o no residencial		5
	6		
	9		

Afiliación a seguridad social en salud	No afiliado	El Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS) es la forma como el Estado Colombiano brinda un seguro que cubre los gastos de salud a los habitantes del territorio nacional, colombianos o extranjeros. (Ministerio de la Protección Social)	0
	Subsidiado		1
	Contributivo		2
	Régimen Especial		3
	Otro		9

6.2 VARIABLES CLÍNICAS

Variable	Valor	Descripción	U. de medida
Diagnóstico médico	Enfermedad Cerebro Vascular	Enfermedad, entidad nosológica, lesión, síndrome o condición de salud de una persona, definida por un profesional médico	1
	Trauma Cráneo Encefálico		2
	Tumor Cerebral		3
	Infección Cerebral		4
	Otro (especificar)		9
Hemicuerpo comprometido	Derecho	Lado del cuerpo con déficit motor, sensorial o perceptivo después de la ocurrencia de una lesión cerebral	1
	Izquierdo		2
Edad de ocurrencia de la condición	Entre 18 y 60	Edad de la persona a la fecha de ocurrencia de la condición que produjo la hemiparesia	Años
Tiempo de evolución de la condición	Igual o mayor a 3	Cantidad de tiempo que ha transcurrido desde la ocurrencia de la condición que produjo la hemiparesia	Meses

6.3 VARIABLES DE TRABAJO

6.3.1 Variable Independiente

Variable	Valor	Descripción	U. de medida
Programa de Intervención	Control	Programa de intervención fisioterapéutica convencional	0
	Experimental	Programa de intervención basado en reaprendizaje motor	1

6.3.2 Variables Dependientes:

Organización Sensorial (Test de Organización Sensorial)	Equilibrio sobre superficie plana y ojos abiertos	De 0 a 30	Segundos
	Equilibrio sobre superficie plana y ojos cerrados	De 0 a 30	Segundos
	Equilibrio sobre goma de espuma fomy y ojos abiertos	De 0 a 30	Segundos
	Equilibrio sobre goma de espuma fomy y ojos cerrados	De 0 a 30	Segundos

7 6. HIPÓTESIS

7.1 HIPÓTESIS NULA ($H_0: \mu_D = 0$)

No existe diferencias en las variables asociadas a la organización sensorial en personas adultas con hemiparesia, entre el grupo que recibe un programa de intervención basado en reaprendizaje motor y el grupo que recibe un programa convencional.

7.2 HIPOTESIS ALTERNATIVAS ($H_1: \mu_D \neq 0$)

Si existen diferencias en las variables asociadas a la organización sensorial en personas adultas con hemiparesia, entre el grupo que recibe un programa de intervención basado en reaprendizaje motor y el grupo que recibe un programa convencional.

8 METODOLÓGIA

8.1 TIPO DE ESTUDIO

Bajo el enfoque empírico-analítico se realizó un ensayo clínico de alcance cuasi experimental.

G₀ Y₁ X₀ Y₂

G₁ Y₁ X₁ Y₂

G₀: Grupo control

G₁: Grupo experimental

Y₁: Medidas pretest (organización sensorial)

Y₂: Medidas posttest (organización sensorial)

X₀: Programa de intervención fisioterapéutica convencional

X₁: Programa de intervención fisioterapéutica basado en el reaprendizaje motor

8.2 POBLACIÓN

Adultos con hemiparesia entre 18 y 60 años.

8.3 MUESTRA Y MUESTREO

Se realizó un muestreo intencional de adultos con hemiparesia entre 18 y 60 años que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. El tamaño de la muestra para cada uno de los grupos se calculó según la siguiente fórmula:

$$n = \frac{2 (z_{\alpha} + z_{\beta})^2 s^2}{d^2}$$

TABLA 2 Estimadores de test de organización sensorial.

Estimador	Test de Organización Sensorial (0-30 segundos)
Nivel de confianza 95% ($Z\alpha$)	1,96
Poder estadístico 80% ($Z\beta$)	0,842
Desviación estándar (s) *	17,76 ¹⁰²
Diferencia esperada entre grupos (d)	9,70
Tamaño de la muestra para cada grupo (n)	36
Tamaño de la muestra ajustada a la perdida (10%) para cada grupo	40

* El superíndice de la desviación estándar corresponde a la referencia bibliográfica

8.3.1 Criterios De Inclusión Del Estudio:

Los criterios de inclusión para los participantes son específicos, incluyen género femenino y masculino, deben contar con una edad entre 18 y 60 años. Deben tener compromiso motor en cualquier hemicuerpo, de cualquier origen y estadio. Así mismo, su condición clínica debe ser estable y contar con autorización médica para participar en el estudio.


También, deben estar afiliados al sistema de seguridad social en salud colombiano Ambulatorio, su compromiso motor debe estar con más de tres meses de evolución y debe firmar el consentimiento informado para aceptar su participación en el estudio.

8.3.2 Criterios de exclusión del estudio:

Los participantes deben tener dificultad para comprender órdenes sencillas. Ni pueden tener co-morbilidad neurológica, u otra condición de salud asociada que le impida realizar las pruebas funcionales, ni contracturas marcadas.

En la figura 4 se muestra el diagrama de flujo del progreso de la muestra a través de las fases del ensayo paralelo de los dos grupos (control y experimental): reclutamiento, asignación de la intervención, seguimiento y análisis.

FIGURA 2 Diagrama de flujo de muestreo y participantes



9 RESULTADOS

9.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

Como se observa en el algoritmo del estudio (figura 4), después de agotadas las fases de reclutamiento, asignación y seguimiento, se analizaron 69 personas adultas con hemiparesia, 34 en el grupo control y 35 en el experimental. El promedio de edad de la totalidad de participantes fue de 41 años con un tiempo promedio de evolución de su condición neurológica de cinco años (tabla 3). La muestra cuenta con una mayor procedencia de usuarios de la ciudad de Manizales, la mayoría de sexo masculino, solteros, desempleados por la condición de salud, de estratos socio-económicos bajo y medio y con afiliación principalmente al régimen contributivo de seguridad social. La muestra contó con el mismo número de usuarios con hemiparesia izquierda y derecha, la mayoría de los participantes presentaron discapacidad moderada causada por las secuelas de la enfermedad cerebro vascular (tabla 4).

Los participantes recibieron entre 15 y 18 sesiones de fisioterapia ambulatoria, tanto los del grupo de estudio como los del grupo control, la cual se basa en propuestas para promover el control postural, la condición física, la competencia para caminar y procesos de hands on para mejorar la alineación, se incluyen todas las que se asocian con un principio sensoriomotriz y de facilitación como el concepto Bobath, método de Kabat, ejercicio terapéutico y Brunnstrom (grupo control) o desde el programa de intervención basado en reaprendizaje motor (grupo experimental). La media de las cuatro pruebas de organización sensorial (test de organización sensorial) osciló entre 12 y 27 segundos para el pre-test y 15 y 28 segundos para el post-test (tabla 3). El mejor desempeño se observó en la prueba de “equilibrio sobre superficie inestable y ojos cerrados”. Los datos específicos para los grupos control y experimental pueden consultar en las tablas 5 y 6.

Ninguna de las variables del estudio superó el supuesto de normalidad ($p < 0,05$) (tabla 3), por tanto, en lo sucesivo se utilizará estadística no paramétrica para las pruebas de hipótesis de comparación de muestras.

Se observó una disminución de la dependencia visual y una mejoría en el sistema sensorial y vestibular, lo cual contribuye a mejorar la estabilidad postural y a disminuir el riesgo de caída en las personas con hemiparesia.

TABLA 3 Descriptivos de variables cuantitativas y pruebas de normalidad para una muestra

Variable	n	Mínimo	Máximo	Media	Desviación Estándar	K-S (Z)	Sig.	
Edad (años)	69	18	61	41,38	12,82	1,049	0,221	
Años de escolaridad	69	2	19	12,05	4,13	1,272	0,079	
Edad de ocurrencia de la condición (años)	69	3	60	36,09	14,89	0,910	0,379	
Tiempo de evolución de la condición (meses)	69	3	384	62,58	75,60	1,789	0,003	
Sesiones de tratamiento (No.)	69	15	18	17,90	0,49	4,474	0,000	
Pre-test								
Test de Organización Sensorial (segundos)								
	Equilibrio sobre superficie plana y ojos abiertos	69	0	30	26,66	7,74	3,976	0,000
	Equilibrio sobre superficie plana y ojos cerrados	69	0	30	22,63	10,19	2,985	0,000
	Equilibrio sobre goma de espuma fomy y ojos abiertos	69	0	30	20,59	12,57	2,930	0,000
	Equilibrio sobre goma de espuma fomy y ojos cerrados	69	0	30	11,53	11,68	1,675	0,007
Post- test								
Test de Organización Sensorial (segundos)								
	Equilibrio sobre superficie plana y ojos abiertos	69	10	30	27,54	6,135	4,125	0,000
	Equilibrio sobre superficie plana y ojos cerrados	69	3	30	24,57	9,319	3,573	0,000
	Equilibrio sobre goma de espuma fomy y ojos abiertos	69	0	30	22,86	10,916	2,925	0,000
	Equilibrio sobre goma de espuma fomy y ojos cerrados	69	0	30	15,21	12,105	1,728	0,005

Siglas.K-S: Prueba Z de Kolmogorov-Smirnov; Sig: significancia asintótica bilateral

TABLA 4 Descriptivos de variable cualitativas (N= 69)

Variable	n	Porcentaje	
Procedencia	Manizales	15	22%
	Pereira	14	20%
	Medellín	11	16%
	Popayán	7	10%
	Bogotá	7	10%
	Ipiales	4	6%
	Cali	4	6%
	Barranquilla	4	6%
	Tunja	3	4%
Sexo	Masculino	43	62%
	Femenino	26	38%
Estado civil	Soltero	34	49%
	Casado	20	29%
	Divorciado	9	13%
	Unión libre	6	9%
Situación laboral	Desempleado por la condición de salud	23	33%
	Pensionado por invalidez	16	23%
	Independiente	10	15%

	Empleado	7	10%
	Estudiante	5	7%
	Desempleado por otras causas	3	4%
	Ama de casa	3	4%
	Jubilado	2	3%
Estrato socio-económico	Bajo (I y II)	31	45%
	Medio (III y IV)	30	43%
	Alto (V)	8	12%
Afiliación a seguridad social en salud	Contributivo	48	70%
	Subsidiado	18	26%
	Régimen especial	2	3%
	No afiliado	1	1%
Diagnóstico médico	Enfermedad Cerebro Vascular	42	61%
	Trauma Cráneo Encefálico	14	20%
	Tumor cerebral	11	16%
	Otro	2	3%
Hemicuerpo comprometido	Izquierdo	35	51%
	Derecho	34	49%
Grado de discapacidad (Pre-test) WHO-DAS 2.0	Leve	20	29%
	Moderada	29	42%
	Severa	20	29%

9.2 DIFERENCIA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES PARA LOS PRE-TEST

Como se observa en las tablas 5 y 6, ninguna de las variables socio-demográficas, clínicas y de trabajo mostraron diferencias significativas entre grupos control y experimental en el pre-test ($p>0,05$), lo que garantiza la homogeneidad de las muestras antes de la intervención.

TABLA 5 Descriptivos y pruebas de diferencias inter-muestrales para las medias en el pre-test (variables cuantitativas)

Variable	Grupo Control					Grupo Experimental					Estadístico de prueba	Sig.	
	n	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar	N	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar			
Edad (años)	34	18	58	40,82	12,15	35	19	61	41,91	13,59	T	0,351	0,727
Años de escolaridad	34	4	19	11,56	3,70	35	2	19	12,53	4,50	T	0,976	0,333
Edad de ocurrencia de la condición (años)	34	3	53	36,00	14,95	35	13	60	36,17	15,04	T	0,047	0,962
Tiempo de evolución de la condición (meses)	34	4	384	58,06	82,65	35	3	276	66,97	69,01	Z	1,243	0,214
Sesiones de tratamiento (No,)	34	15	18	17,79	0,69	35	18	18	18,00	0,00	Z	1,783	0,075
Equilibrio sobre superficie plana y ojos abiertos	34	6	30	26,90	7,22	35	0	30	26,43	8,30	Z	-0,299	0,765
Equilibrio sobre superficie plana y ojos cerrados	34	4	30	22,08	10,10	35	0	30	23,17	10,39	Z	0,716	0,474
Equilibrio sobre goma de espuma fomy y ojos abiertos	34	0	30	20,76	12,73	35	0	30	20,43	12,59	Z	-0,047	0,963
Equilibrio sobre goma de espuma fomy y ojos cerrados	34	0	30	11,11	11,60	35	0	30	11,94	11,92	Z	0,242	0,809

TABLA 6 Descriptivos y pruebas de diferencias inter-muestrales para las proporciones en el pre-test (variables cualitativas)

Variable		Control (n = 34)		Experimental (n=35)		Chi ²	Sig.
		n	%	n	%		
Procedencia	Barranquilla	2	5,9%	2	5,7%	1,048	0,998
	Bogotá	3	8,8%	4	11,4%		
	Cali	2	5,9%	2	5,7%		
	Manizales	8	23,5%	7	20,0%		
	Medellín	6	17,6%	5	14,3%		
	Pereira	6	17,6%	8	22,9%		
	Popayán	3	8,8%	4	11,4%		
	Tunja	2	5,9%	1	2,9%		
Sexo	Femenino	14	41,2%	12	34,3%	0,349	0,555
	Masculino	20	58,8%	23	65,7%		
Estado civil	Soltero	15	44,1%	19	54,3%	4,324	0,229
	Casado	11	32,4%	9	25,7%		
	Divorciado	3	8,8%	6	17,1%		
	Unión libre	5	14,7%	1	2,9%		
Situación laboral	Empleado	3	8,8%	4	11,4%	3,320	0,345
	Independiente	4	11,8%	6	17,1%		
	Estudiante	4	11,8%	1	2,9%		
	Jubilado	0	0,0%	2	5,7%		
	Pensionado por invalidez	6	17,6%	10	28,6%		
	Desempleado por la condición de salud	13	38,2%	10	28,6%		
	Desempleado por otras causas	1	2,9%	2	5,7%		
Estrato socio-económico	Bajo (I y II)	18	52,9%	13	37,1%	7,519	0,111
	Medio (III y IV)	14	41,2%	16	45,7%		
	Alto (V)	2	5,9%	6	17,1%		
Afiliación a seguridad social en salud	No afiliado	1	2,9%	0	0,0%	3,320	0,345
	Subsidiado	9	26,5%	9	25,7%		
	Contributivo	22	64,7%	26	74,3%		
	Régimen especial	2	5,9%	0	0,0%		
Diagnóstico médico	Enfermedad Cerebro Vascular	20	58,8%	22	60,9%	2,172	0,704
	Trauma Cráneo Encefálico	7	20,6%	7	20,3%		
	Tumor Cerebral	5	14,7%	6	15,9%		
	Infección Cerebral	1	2,9%	0	1,4%		
	Otro	1	2,9%	0	1,4%		
Hemicuerpo comprometido	Derecho	15	44,1%	19	54,3%	0,713	0,398
	Izquierdo	19	55,9%	16	45,7%		
Grado de discapacidad (WHO-DAS 2,0)	Leve	10	29,4%	10	28,6%	0,020	0,990
	Moderada	14	41,2%	15	42,9%		
	Severa	10	29,4%	10	28,6%		

Siglas. Ch²: Prueba del chi cuadrado; Sig.: Significancia asintótica bilateral

9.3 DIFERENCIA DE MUESTRAS RELACIONADAS (DIFERENCIA ENTRE PRE-TEST Y POST-TEST)

Tanto el grupo control como el experimental evidenciaron diferencias significativas en el post-test respecto al pre-test en la prueba de “equilibrio sobre superficie inestable y ojos cerrados” ($p < 0,05$). No se encontraron diferencias significativas intramuestrales en las restantes tres pruebas (tabla 7). Lo anterior permite rechazar la hipótesis nula para la prueba 4, lo que permite concluir que existe mejoría en la organización sensorial basado en el equilibrio sobre superficie inestable y ojos cerrados, tanto en el grupo de personas con hemiparesia que recibió tratamiento convencional como en el que recibió un programa basado en reaprendizaje motor.

TABLA 7 Organización sensorial. Diferencias intra-muestrales (Muestras relacionadas: pre-test vs post-test)

Variable	Grupo Control (n=34)					Grupo Experimental (n=35)				
	Medias			Z	Sig.	Medias			Z	Sig.
	Pre-test	Post-test	Diferencia			Pre-test	Post-test	Diferencia		
Equilibrio sobre superficie plana y ojos abiertos (segundos)	26,90	27,50	0,60	1,051	0,293	26,43	27,57	1,14	1,183	0,237
Equilibrio sobre superficie plana y ojos cerrados (segundos)	22,08	24,66	2,58	1,686	0,092	23,17	24,49	1,32	1,005	0,315
Equilibrio sobre goma de espuma fomy y ojos abiertos (segundos)	20,76	23,24	2,48	1,643	0,100	20,43	22,50	2,07	1,527	0,127
Equilibrio sobre goma de espuma fomy y ojos cerrados (segundos)	11,11	14,10	2,99	2,208	0,027	11,94	16,29	4,35	3,110	0,002

Siglas. Z: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon; Sig.: Significancia asintótica bilateral

Nota: las diferencias se calcularon restando la media del post-test a la media del pre-test

9.4 DIFERENCIA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES PARA LAS MEDIDAS DE CAMBIO PRE-TEST Y POST-TEST

Dados los resultados de la prueba de normalidad para una muestra (tabla 8), el análisis de diferencias para las medidas de cambio se realizará con estadística no paramétrica ($p < 0,05$)

TABLA 8 Pruebas de normalidad para las medidas de cambio post-test vs pre-test

Variable		n	K-S (Z)	Sig.
Test de Organización Sensorial (segundos)	Equilibrio sobre superficie plana y ojos abiertos	69	3,377	0,000
	Equilibrio sobre superficie plana y ojos cerrados	69	2,454	0,000
	Equilibrio sobre goma de espuma fomy y ojos abiertos	69	2,353	0,000
	Equilibrio sobre goma de espuma fomy y ojos cerrados	69	1,715	0,006

Siglas. K-S: Prueba Z de Kolmogorov-Smirnov; Sig.: significancia asintótica bilateral

Como se aprecia en la tabla 9, no hubo diferencias significativas intermuestrales en las medidas de cambio para ninguna de las pruebas del test de organización sensorial entre grupos control y experimental ($p > 0,05$). Lo anterior acepta la hipótesis nula, por la cual se concluye que no hay diferencias significativas en las medidas de cambio entre el grupo control y el grupo experimental. Estos hallazgos se ilustran en la figura 5, en donde se observan la homogeneidad de las medianas y la gran dispersión de los datos.


TABLA 9 Diferencias inter-muestrales para las medidas de cambio (post-test - pre-test)

Variable		Media			Estadístico de prueba		Sig.
		Control	Experimental	Diferencia			
Organización sensorial (segundos)	Equilibrio sobre superficie plana y ojos abiertos	0,60	1,14	0,54	Z	0,299	0,765
	Equilibrio sobre superficie plana y ojos cerrados	2,58	1,31	-1,27	Z	-0,638	0,523
	Equilibrio sobre goma de espuma fomy y ojos abiertos	2,47	2,08	-0,39	Z	-0,007	0,995
	Equilibrio sobre goma de espuma fomy y ojos cerrados	2,99	4,34	1,35	Z	1,147	0,251

Siglas. Z: Prueba Z de Mann-Whitney; Sig.: Significancia asintótica bilateral

Nota: las medias de los grupos se calcularon mediante la diferencia entre el post-test y el pre-test. La diferencia se calculó restando la media del grupo experimental a la media del grupo control.

FIGURA 3 Diagrama de caja. Medidas de cambio del Test de Organización Sensorial



10 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La estabilidad postural es un factor importante para ejecutar cualquier actividad de forma segura y sin sentir miedo a caer. De acuerdo con Shumway-Cook y Horak (61), el sistema de control postural está constituido por un sistema de aferencias sensoriales que informan sobre el balanceo del cuerpo y éste a su vez proporciona un mecanismo de compensación sensorial, es decir, brindan información sobre la posición del cuerpo, donde el sistema visual, vestibular y somatosensorial, son los principales contribuyentes al equilibrio. Es por esto, que la organización sensorial se convierte en un factor crítico cuando hay un conflicto entre los sentidos.

De acuerdo a lo anterior, en esta investigación el objetivo fue establecer el efecto de un programa de intervención basado en reaprendizaje motor sobre la organización sensorial en adultos con hemiparesia. Donde participaron 69 adultos; 34 personas fueron asignadas al grupo control, las cuales recibieron un programa de intervención fisioterapéutica convencional, basada en conceptos como Bobath, Kabat, ejercicio terapéutico y Brunnstrom. Así mismo, al grupo experimental se le asignó 35 participantes, que recibieron un programa de intervención basado en reaprendizaje motor, durante 6 semanas y con 3 sesiones/semana (ver protocolo de intervención).

La medida de seguimiento durante el pretest y posttest fue el test de organización sensorial; éste evalúa cuatro ítems que incluyen la interacción de la información visual y somatosensorial, con respecto al sistema vestibular, en personas con compromiso neurológico. Esta prueba evalúa la estabilidad durante su realización en un tiempo de 30 segundos, incluyendo la estabilidad en bípedo sobre una superficie estable con ojos abiertos y cerrados y la estabilidad en bípedo sobre superficie inestable igualmente con ojos cerrados y abiertos.

En los resultados, la comparación del post test con el pretest se evidenció que, en la prueba de organización sensorial se obtuvo una mejoría significativa para el desempeño en el cuarto ítem correspondiente a estabilidad en bípedo sobre superficie inestable con ojos

cerrados, lo cual refleja un adecuado uso de las aferencias sensoriales para mejorar la organización sensorial y la estabilidad, en el grupo de personas con hemiparesia que recibieron un programa de intervención basado en reaprendizaje motor y programa de intervención fisioterapéutica convencional

Lo anterior se debe a que la prueba de organización sensorial proporciona un método para dividir las aferencias sensoriales y evalúa el impacto de las situaciones de conflicto sensorial, mostrando una mayor influencia del cuerpo cuando el apoyo es en la superficie inestable (cojín de goma espuma de foamy) y cuando las entradas visuales se eliminan, lo que genera conflicto de la información somatosensorial con la vestibular (62).

En este sentido, Bayouk et al., (63) encontraron que los efectos de un programa de ejercicio basado en principios de reaprendizaje motor orientado a la tarea asistido por la organización sensorial, es eficaz para mejorar el equilibrio estándar en personas con hemiparesia comparado con programa orientado a la tarea convencional. En esta investigación lograron una disminución significativa en el balanceo antero-posterior y medio-lateral, del grupo experimental que desarrollo los mismos ejercicios que el grupo control, con ausencia de la visión. En el grupo que recibió solo el entrenamiento de reaprendizaje motor orientado a la tarea, se observaron cambios muy limitados en las tareas de equilibrio tanto estáticas como dinámicas. Además, esta mejoría no se tradujo en una reducción del balanceo lateral, el cual está anormalmente incrementado en personas con hemiparesia a causa de una enfermedad cerebrovascular durante la posición bípeda y la transición de sedente a bípedo.

De igual manera, Park et al., (64) encontraron que un entrenamiento orientado a la tarea combinado con entrada sensorial alterada, puede mejorar el balance funcional en pacientes con enfermedad cerebrovascular crónico, comparado con entrenamiento orientado a la tarea de forma estándar. Lo que permite concluir que existe mejoría en la organización sensorial basado en el equilibrio sobre superficie inestable y ojos cerrados, tanto en el grupo de personas con hemiparesia que recibió tratamiento convencional, como en el que recibió un programa basado en reaprendizaje motor. Esto se debe a que los participantes con

enfermedad cerebrovascular dependen particularmente de la información visual para mantener el equilibrio (65). Lo anterior sucede por que la entrada sensorial al cerebro disminuye el grado de confianza en otros sentidos, y aumenta cuando se integran. Como resultado, el tiempo requerido para la integración sensorial se retrasa, lo que finalmente conduce a una capacidad de equilibrio reducida (66).

En los estudios anteriores, se observó que el concepto más eficaz para mejorar el equilibrio y la estabilidad en personas que han sufrido enfermedad cerebrovascular, fue basado en un programa de reaprendizaje motor para mejorar el sistema somatosensorial alterado, como lo hallado en el estudio de Duijnhoven et al., (67) sobre el efecto de un entrenamiento del equilibrio y la estabilidad, mediante ejercicios aeróbicos de alta intensidad, transferencias de peso y ejercicios multisensoriales en la fase crónica de las personas que sufrieron un enfermedad cerebrovascular. Los autores realizaron una revisión sistemática con meta-análisis, donde incluyeron ensayos aleatorizados cuya medición a los participantes se realizó con el test de organización sensorial (SOT) y además concluyeron que el entrenamiento propuesto fue exitoso específicamente en la estabilidad y otros componentes, ya que contenían ejercicios basados en los principios del enfoque de reaprendizaje motor, como lo es mejorar la fuerza muscular, la amplitud articular y facilitar la retroalimentación de los sistemas vestibular, visual y somatosensorial, para llevar a la persona con afectación de la motoneurona superior a mejorar la estabilidad postural durante la actividades de la vida diaria.

Dada la presencia de alteraciones en los sistemas sensoriales los cuales son componentes básicos de la estabilidad, se observa el beneficio que las personas con secuelas de enfermedad cerebrovascular han obtenido mediante programas de neurorehabilitación funcional basado en enfoques contemporáneos como el Modelo de Reaprendizaje Motor, con el fin de disminuir el riesgo de caída y por ende el riesgo de adquirir una discapacidad en esta población. Esto se corrobora mediante el resultado positivo en la prueba “equilibrio sobre superficie inestable y ojos cerrados” la cual es muy exigente para la estabilidad de las

personas con hemiparesia, y da indicios que el programa de reaprendizaje motor tiene un impacto positivo sobre la organización sensorial en estas personas.

Con respecto a la terapia convencional, para mejorar la organización sensorial Smania et al., (68) encontraron que siguiendo un programa de entrenamiento basado en la transferencia de peso y ejercicios de balance realizados bajo diferentes condiciones sensoriales alteradas (variando la estabilidad de la superficie y enmascarando de la visión) hay una mejoría significativa en su capacidad para mantener el control del equilibrio en personas con enfermedad cerebrovascular crónica. Comparado con este estudio, los cambios evidenciados se deben a las condiciones de entrenamiento presente en ambos programas donde los estímulos sensoriales hicieron parte del entrenamiento, obteniendo de esta manera, resultados positivos tanto para el grupo experimental como el control. De la misma forma, estos cambios no pueden ser atribuidos a la recuperación espontánea, porque todas las personas incluidas en ambas investigaciones, se encontraban en una etapa crónica de la condición de salud, además, ambas investigaciones usaron como herramienta de evaluación el test de organización sensorial.

Es procedente reconocer el valor de la organización sensorial para la estabilidad en el funcionamiento de una persona, ya que no solamente permite la interacción con otras personas y con su entorno, sino también el autocuidado. Así mismo, Chan et al., (20) compararon el efecto de un programa de reaprendizaje motor en el grupo experimental, con un programa de fisioterapia convencional para el grupo control, en el cual participaron 95 personas con secuelas de enfermedad cerebrovascular, quienes se encontraban en la fase crónica; ambos grupos recibieron 18 sesiones durante seis semanas cuyos resultados arrojaron diferencias significativas en el post – test para el grupo experimental en la variable del equilibrio durante las tareas funcionales de autocuidado y equilibrio. Los autores concluyeron que el programa de reaprendizaje motor es efectivo para la recuperación funcional en las personas con secuelas de enfermedad cerebrovascular, al igual que Park et al., (64) y Bayouk et al., (63).

11 CONCLUSIONES

En las muestras relacionadas se rechaza la hipótesis nula, porque hay diferencias significativas en el post-test respecto al pre-test en la prueba de “equilibrio sobre superficie inestable y ojos cerrados” tanto en el grupo control que recibió el programa de fisioterapia convencional y el grupo experimental basado en el modelo de reaprendizaje motor; sin embargo, la mejoría es mayor en el grupo experimental. Por lo tanto, la intervención basada en el modelo de reaprendizaje motor, puede ser un enfoque efectivo dentro de la neurorehabilitación, para mejorar la organización sensorial, por ende el control postural y disminuir la incidencia de caídas durante la realización de actividades funcionales en los adultos con hemiparesia entre 18 y 60 años,

Para las medidas de cambio se acepta la hipótesis nula, porque no hay diferencias en las medidas de cambio entre grupo control que recibió el programa de fisioterapia convencional y el grupo experimental basado en el modelo de reaprendizaje motor. Por lo tanto, la aplicación de programa de reaprendizaje motor orientado a la tarea como un programa de intervención convencional, son efectivos para mejorar la organización sensorial en las personas con hemiparesia. Lo que indica que independiente cualquier actividad desarrollada dentro del proceso terapéutico, el ejercicio, el decir, el movimiento en sí, mejora la función de los individuos con relación a la organización sensorial. Además, los resultados son mejores cuando se tiene en cuenta en el proceso de tratamiento el entrenamiento basado en condiciones sensorialmente alteradas como el uso de superficies inestables de diferentes modalidades, exclusión de la visión y cambios en las posturas.

12 LIMITACIONES

Debido a las características del presente estudio se dificultó la aleatorización de las personas participantes y el enmascaramiento de los que hicieron la intervención.

No se controló la intervención realizada en el grupo que recibió terapia física convencional ya que esta era realizada en las instituciones que tenían convenio con sus EPS, lo que pone en duda si dentro de la intervención se incluyera actividades bajo el modelo de reaprendizaje motor.

Pese a que el tiempo de intervención de seis semanas está dentro de los tiempos estipulados que muestran efectos en los procesos de intervención, se recomienda que se puedan hacer otros estudios con tiempos más prolongados entre 12 a 18 semanas.

13 RECOMENDACIONES

TEORICAS:

Se recomienda investigar el desempeño que ejerce cada sistema tanto, visual, somatesensorial y vestibular, de forma individual en el control postural de las personas con hemiparesia.

Igualmente tener en cuenta el uso de otras medidas de seguimiento como la escala de Berg, exámenes de laboratorio de marcha y las plataformas para la posturografía.

Por último, se recomienda a los fisioterapeutas enfatizar en la intervención basada en el modelo de reaprendizaje motor y realizar un seguimiento en los adultos con hemiparesia mediante valoraciones periódicas de la organización sensorial para mitigar el riesgo a la caída.

METODOLOGICAS:

Continuar con investigaciones donde se estudie el efecto en la organización sensorial aplicando el modelo de reaprendizaje motor en personas con hemiparesia.

Trabajar con grupos aleatorizados para evitar sesgo de selección.

Controlar la intervención realizada en el grupo que recibió terapia física convencional para evitar el sesgo de intervención.

Realiza programa de seguimiento a los participantes de la presente investigación después de aplicación de los programas basado en modelo de reaprendizaje motor y programa de terapia convencional para medir la permanencia de las mejorías.

14 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1) Barroso JM, García MI, Domínguez R, Mikhailenok E, Voroninca O. Recuperación funcional total en el paciente hemiparético izquierdo postraumatismo craneal mediante programa computarizado de Biofeedback Neuromuscular Remiocor-2. *Rev Esp Neuropsicología*. 1999; 1(2-3):69-88.
- 2) Odriozola FA, Iriarte M, Mendía A, Murgialdai A, Marco P. Pronóstico de las secuelas tras la lesión cerebral. *Med. Intensiva*. 2009; 33(4):171-81.
- 3) Barret, JP, Blackburn, JP, DuBoi, R, Drazen, E, Gal JE. Neuroepidemiology in the developing countries. *The Royal Society of Medicine*. 1982; 75,305-6.
- 4) PROGRESS Collaborative Group. Randomised trial of a perindopril-based blood-pressure-lowering regimen among 6105 individuals with previous stroke or transient ischaemic attack. *Lancet*. 2001; 358:1033-41.
- 5) Pan American Health Organization. Health conditions in the Americas, 1994 edition. Washington DC: PAHO, Sci Publ. 1994; 549:217-25.
- 6) Chaves-Sell F, Tulio-Medina M. Epidemiología de la enfermedad cerebro vascular en Latinoamérica. *Rev Neurol (Ecu)*. 2004;13(1):2.
- 7) Pradilla G, Vesga BE, León FE, Grupo GENECO. Estudio neuroepidemiológico nacional (EPINEURO) colombiano. *Rev Panam Salud Pública*. 2003;14(2).
- 8) Silva FA, Zarruk JF, Quintero C. Cerebrovascular disease in Colombia. *Rev. Colomb. Cardiología*. 2006; 13(2):85-9.
- 9) World Health Organization. Global status report on road safety: time for action. Geneva (Switzerland): WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 2009.
- 10) Cano de la Cuerda R, Martínez RM, Miangolarra JC. Control y aprendizaje motor. Fundamentos, desarrollo y reeducación del movimiento humano. Madrid: Ed. Médica Panamericana, 2017.
- 11) Ikai T, Kamikubo T, Takehara I, Nishi M, Miyano M. Dynamic postural control in patients with hemiparesis. *Am J Phys Med Rehabil*. 2003; 82:463-9.
- 12) Molina F, Monge E, Molina MJ. Alteraciones en el control postural. En: Cano de la Cuerda R, Martínez RM, Miangolarra JC. Control y aprendizaje motor.

Fundamentos, desarrollo y reeducación del movimiento humano. Madrid: Ed. Médica Panamericana, 2017.

- 13) Paillex R, So A. Posture debout chez sujet adultes: spécificités de l'hémiplégie. *Ann Readapt Med Phys.* 2003; 46:71–8.
- 14) Kirker SG, Simpson DS, Jenner JR, Wing AM. Stepping before standing: hip muscle function in stepping and standing balance after stroke. *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* 2000; 68:458–64.
- 15) Malouin F, Potvin M, PrbvostJ, et al. Use of an intensive task-oriented gait-training program in a series of patients with acute cerebrovascular accidents. *Phys Ther.* 1992; 72:781-93.
- 16) Carvalho-Pinto B, Faria C. Health, function and disability in stroke patients in the community. *Braz J Phys Ther.* 2016 Jul-Aug; 20(4): 355–366
- 17) Murtezani A, Hundozi H, Gashi S, Osmani T, Krasniqi V, Rama B. Factors associated with reintegration to normal living after stroke. *Med Arh.* 2009; 63(4):216-9
- 18) Teasell R, Meyer MJ, McClure A, Pan C, Murie-Fernandez M. Stroke Rehabilitation: An International Perspective. *Top Stroke Rehabil.* 2009; 16(1):44–56.
- 19) Kumar-Immadi S, Kumar-Achyutha K, Reddy A, Priya-Tatakuntla K. Effectiveness of the Motor relearning approach in promoting physical function of the upper limb after stroke. *Int J Physiother.* 2015; 2(1):386-90.
- 20) Chan D, Chan Ch. C, Ks Au K. Motor relearning programme for stroke patients: a randomized controlled trial. *Clin Rehabil.* 2006; 20:191:/200
- 21) Hamzat TK, Olaleye OA, Akinwumi OB. Functional ability, community reintegration and participation restriction among community-dwelling female stroke survivors in Ibadan. *Ethiop J Health Sci.* 2014 Jan; 24(1):43-8
- 22) Carr JH, Shepherd RB. The changing face of neurological rehabilitation. *Rev Bras Fisioter* 2006; 10(2):147-56.
- 23) República de Colombia - Ministerio de Salud. Resolución N^o 008430. Santafé de Bogotá: 1993

- 24) Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS).
Pautas Éticas Internacionales para la Investigación y experimentación biomédica en seres humanos, Ginebra; 1993: 53-5
- 25) Knott M, Kabat H. Proprioceptive facilitation therapy for paralysis. *Physiotherapy*. 1954; 40:171-6
- 26) Pinzón MY. Tendencias actuales del aprendizaje motor como estrategia de intervención fisioterapéutica. *Memorias XII congreso Latinoamericano de Fisioterapia y Kinesiología*. 2006;51
- 27) Carr J, Shepherd RB. *Fisioterapia en los trastornos cerebrales - Guía clínica*. Buenos Aires: Médica Panamericana 1985.
- 28) Refshauge K, Ada L, Ellis E. *Science-Based Rehabilitation. Theories into practice*. USA: Elsevier 2005.
- 29) Carr J, Shepherd RB. *Movement Science: Foundations for physical therapy in rehabilitation*. Maryland: Aspen Publications 1987.
- 30) Carr J, Shepherd RB. *Neurological Rehabilitation. Optimizing Motor Performance*. Oxford: Butterworth-Heinemann 1998.
- 31) Carr J, Shepherd RB. *Rehabilitación de pacientes en el Ictus. Pautas de ejercicios y entrenamiento para optimizar las habilidades motoras*. Madrid: Elsevier 2004.
- 32) Sánchez A, Arana JI. Reaprendizaje motor orientado a la tarea. En Cano de la Cuerda R, Collado S. *Neurorrehabilitación: Métodos específicos de valoración y tratamiento*. Madrid: Médica Panamericana 2012.
- 33) Carr J, Shepherd RB. Motor learning model for stroke rehabilitation. *Physiother*. 1989; 75(7):372-80.
- 34) Canning C, Dean CM, Ada L. Reflections on the career of Janet Carr - a physiotherapy trailblazer. *New Zealand Journal of Physiother*. 2015; 43(1):1-2.
- 35) Carr J, Shepherd RB, Ada L. Spasticity: research findings and implications for intervention. *Physiother* 1995;81(8):421-9.
- 36) Pérez de Heredia M, Martínez RM, Sánchez C. Alcance, prensión y manipulación. Alteraciones y tratamiento. En: Cano de la Cuerda R, Martínez RM, Miangolarra

- JC. Control y Aprendizaje Motor. Fundamentos, desarrollo y reeducación del movimiento humano. Madrid: Médica Panamericana 2016.
- 37) Lennon S. The theoretical basis of neurological physiotherapy. En: Refshauge, Ada L, Ellis E. Science-Based Rehabilitation. Theories into practice. USA: Elsevier 2005.
- 38) Newham DJ. Muscle Performance after stroke. En: Refshauge K, Ada L, Ellis E. Science-Based Rehabilitation. Theories into practice. USA: Elsevier 2005.
- 39) Andrews AW, Bohannon RW. Distribution of muscle strength impairments following stroke. *Clinical Rehabilitation*. 2000; 14:79–87.
- 40) Badics E, Wittmann A, Rupp M, et al. Systematic muscle building exercises in the rehabilitation of stroke patients. *Neurorehabilitation*. 2002; 17:211–4.
- 41) Teixeira-Salmela LF, Olney SJ, Nadeau S, et al. Muscle strengthening and physical conditioning to reduce impairment and disability in chronic stroke survivors. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*. 1999;80:1211–8.
- 42) Lance JW. What is spasticity? *Lancet* 1990; 335:606
- 43) Singer RN, Cauraugh JH. To be aware or not aware? What to think about when learning and performing a motor skill. *Sport Psychologist*. 1993; 7:19-30.
- 44) Akeson WH, Amiel D, Abel MF. Effects of immobilization on joints. *Clin Orthop Relat Res*. 1987; 219:28-37.
- 45) English C, Hillier S, Kaur G, Hundertmark L. People with stroke spend more time in active task practice, but similar time in walking practice, when physiotherapy rehabilitation is provided in circuit classes compared to individual therapy sessions: an observational study. *Journal of Physiother*. 2014; 60:50–4.
- 46) Treacy D, Shurr K, Sherrington C. Balance circuit classes to improve balance among rehabilitation inpatients: a protocol for a randomised controlled trial. *BMC Geriatric*. 2013; 13:75.
- 47) Alguacil IM, Martínez RM, Laguarda S. Control postural. En: Cano de la Cuerda R, Martínez RM, Miangolarra JC. Control y aprendizaje motor. Fundamentos, desarrollo y reeducación del movimiento. Madrid: Médica Panamericana 2016

- 48) Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor Control. Translating research into clinical practice, Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins, 4^a ed., 2012.
- 49) Horak FB. Postural orientation and equilibrium: what do we need to know about neural control of balance to prevent falls? *Age and Ageing*. 2006; 35-S2: ii7–11.
- 50) Ting LH, Macpherson JM. A limited set of muscle synergies for force control during a postural task. *J Neurophysiol*. 2005; 93:609–13.
- 51) Horak FB. Clinical measurement of postural control in adults. *Phys Ther*. 1987; 67(12):1881-85.
- 52) Massion J. Postural control system. *Curr Opin Neurobiol*. 1994; 4(6):877-87.
- 53) Meadows L, Williams J. An Understanding of Functional movement as a basis for clinical reasoning. En: Raine S, Meadows L, Lynch-Ellerington. *Bobath Concept. Theory and clinical practice in neurological rehabilitation*. Reino Unido: Wiley-Blackwell 2010.
- 54) Pollock AS, Durward BR, Rowe PJ, Paul JP. What is balance? *Clin Rehabil*. 2000; 4(4):402-6.
- 55) Huxham FE, Goldie PA, Patla AE. Theoretical considerations in balance assessment. *Australian Journal of Physiotherapy*. 2001; 47:89-100.
- 56) Horak FB, Nashner LM, Diener HC. Postural strategies associated with somatosensory and vestibular loss. *Exp Brain Res*. 1990; 82:167-77.
- 57) Ruhland J, Le Van Kan P. Medial pontine haemorrhagic stroke. *Phys Ther* 2003; 83(6), 552-66.
- 58) Peterka RJ, Loughlin PJ. Dynamic regulation of sensorimotor integration in human postural control. *J Neurophysiol*. 2004; 91(1):410–23.
- 59) Tinetti ME. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. *J Am Geriatr Soc*. 1986; 34(2):119–26.
- 60) Coben H, Blatchly GI, Gombash LL. A study of the Clinical Test of Sensory Interaction and Balance. *Phys Ther*. 1993; 73:3.
- 61) Shumway-Cook A, Horak FB. Assessing the Influence of Sensory Interaction on Balance: Suggestion from the Field. *Phys Ther a*. 1986;66:1548--50. *Arch*.

- 62) Hugues A, Di Marco J, Janiaud P, et al. Efficiency of physical therapy on postural imbalance after stroke: study protocol for a systematic review and metaanalysis. *BMJ Open* 2017;7: e013348
- 63) Bayouk, J.-F. Balance training following stroke: effects of task-oriented exercises with and without altered sensory input. Montreal, Canada: *International Journal of Rehabilitation Research*. 2006.
- 64) Park MH, Won JI. The effects of task-oriented training with altered sensory input on balance in patients with chronic stroke. *J Phys Ther Sci*, 2017, 29: 1208–1211.
- 65) Leroux A, Pinet H, Nadeau S: Task-oriented intervention in chronic stroke: Changes in clinical and laboratory measures of balance and mobility. *Am J Phys Med Rehabil* 2006; 85:820–830.
- 66) Fa Metwally H, Mansour W, Ashour A, Fayed H Comparison between the effects of task oriented program and balance training on postural stability in stroke patients. *International Journal of Therapies and Rehabilitation Research* 2015;4 (5): 298-304.
- 67) Duijnhoven H, Heeren A, Peters M, Veerbeek J, Kwakkel G, Geurts A, & Weerdesteyn, V. Effects of exercise therapy on balance capacity in chronic stroke: systematic review and meta-analysis. *Stroke*. 2016; 47(10), 2603-2610.
- 68) N Smania A, Picelli M, Gandolfi A, Fiaschi M, Tinazzi. Rehabilitation of sensorimotor integration deficits in balance impairment of patients with stroke hemiparesis: a before/after pilot study Department of Neurological and Vision Sciences Neurorehabilitation Section University of Verona, Italy. 2008; 29:313–319.
- 69) Bonan., Et al. Sensory reweighting in controls and stroke patiente. *Clinical Neurophysiology Science Direct Reseach*. 2012; 124 (2013): 713–722
- 70) Rensink M., Schuurmans M., Lindeman E. and Hafsteinsdóttir. Task-oriented training in rehabilitation after stroke: systematic review. *Journal Of Advanced Nursing*. 2009; 65(4): 737-754
- 71) Martín Sanz, E., Barona De Guzmán, R., Comeche Cerverón, C., & Baydal, J. Análisis de la interacción visuo-vestibular y la influencia visual en el control postural. *Acta Otorrinolaringológica Española*. 2004; 55(1): 9-16.

72) Di Fabio, R. P., & Badke, M. B. Relationship of Sensory Organization to Balance Function in Patients with Hemiplegia. *Physical Therapy*. 1990; 70(9): 542–548.

Hu, M. -h., & Woollacott, M. H. Multisensory Training of Standing Balance in Older Adults: I. Postural Stability and One-Leg Stance Balance. *Journal of Gerontology*. 1994; 49(2): M52–M61.

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES
FACULTAD DE SALUD
MAESTRÍA EN NEUROREHABILITACIÓN

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIONES*

INVESTIGACIÓN: “Efecto de un programa de intervención basado en reaprendizaje motor sobre el control postural, la calidad de vida relacionada con la salud y la discapacidad en adultos con hemiparesia”

Ciudad y fecha: _____

Yo, _____ una vez informado sobre los propósitos, objetivos, procedimientos de evaluación que se llevarán a cabo en esta investigación y los posibles riesgos que se puedan generar de ella, autorizo a _____ y _____, estudiantes de maestría de la Universidad Autónoma de Manizales, para la realización de los siguientes procedimientos, según el instrumento de evaluación a mí explicado:

Evaluación de control postural: equilibrio, organización sensorial, estabilidad durante la marcha, control postural anti-gravitatorio y calidad de patrones de movimiento (extremidades y tronco)

Evaluación del grado de discapacidad: WHO-DAS 2.0

Evaluación de calidad de vida relacionada con la salud: WHOQOL-BREF

Intervención fisioterapéutica durante seis semanas, tres sesiones por semana.

Adicionalmente se me informó que:

Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en libertad de retirarme de ella en cualquier momento.

La evaluación previa y posterior se me realizará sin costo.

Salvo los esperados efectos benéficos en mi proceso de rehabilitación, no recibiré otro tipo de beneficio personal por mi participación en este proyecto de investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos permitirán mejorar los procesos de evaluación y rehabilitación de pacientes con condiciones clínicas similares a las mías.

Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico. El

archivo del estudio se guardará en la Universidad Autónoma de Manizales bajo la responsabilidad de los investigadores.


Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas como empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de seguros u otras instituciones educativas. Esto también se aplica a mi cónyuge, a otros miembros de mi familia y a mis médicos.

El principal riesgo que puedo correr durante este estudio es una caída.

En caso que los resultados de la intervención del grupo de estudio contrario al que pertenezco, sean significativamente mejores, se me garantizará, que una vez terminado el presente estudio, se me realizarán 10 sesiones de fisioterapia con ese programa de intervención.

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de manera libre y espontánea.

Firma persona o acudiente



Cedula de ciudadanía No. _____ de _____

* Aprobado por el Comité de Bioética de la UAM: Acta 66 de Mayo 10 de 2017

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES
FACULTAD DE SALUD
MAESTRÍA EN NEUROREHABILITACIÓN

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN
EN INVESTIGACIONES

INVESTIGACIÓN: “Efecto de un programa de intervención basado en reaprendizaje motor sobre el control postural, la calidad de vida relacionada con la salud y la discapacidad en adultos con hemiparesia”

Objetivo General: Establecer el efecto de un programa de intervención basado en reaprendizaje motor sobre el control postural, la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) y la discapacidad en adultos con hemiparesia.

Objetivos Específicos

Determinar el efecto de un programa de intervención basado en el reaprendizaje motor sobre el balance de adultos con hemiparesia.

Determinar el efecto de un programa de intervención basado en el reaprendizaje motor sobre la organización sensorial de adultos con hemiparesia.

Determinar el efecto de un programa de intervención basado en el reaprendizaje motor sobre la estabilidad durante la marcha de adultos con hemiparesia

Determinar el efecto de un programa de intervención basado en el reaprendizaje motor sobre el control postural anti-gravitatorio de adultos con hemiparesia

Determinar el efecto de un programa de intervención basado en el reaprendizaje motor sobre la calidad de los patrones de movimiento de adultos con hemiparesia.

Determinar el efecto de un programa de intervención basado en el reaprendizaje motor sobre la discapacidad de adultos con hemiparesia.

Determinar el efecto de un programa de intervención basado en el reaprendizaje motor el nivel de calidad de vida relacionada con la salud de adultos con hemiparesia.

Procedimientos y riesgos esperados:

Control postural:

Riesgo de caída con las posibles consecuencias: lesiones músculo-esqueléticas (esguince, fractura, desgarro muscular, etc.).

Pérdida de la estabilidad.

Mareos.

Ansiedad previa a la evaluación.

Frustración ante la tarea propuesta

Fatiga durante la evaluación

Evaluación de la discapacidad: entrevista, no genera riesgo alguno para la persona

Evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud: entrevista, no genera riesgo alguno para la persona

Programa de intervención fisioterapéutica:

Riesgo de caída

Fatiga

Riesgo cardiovascular

Exacerbación de deficiencias

Beneficios:

Reconocimiento objetivo de la funcionalidad referida al control postural, el grado de discapacidad y el nivel de calidad de vida relacionada con la salud.

Contribución al proceso de rehabilitación

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
COMITÉ DE BIOÉTICA**



ANEXO 2 PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE PACIENTES EN INVESTIGACIÓN

Nombre de la investigación: Efecto de un programa de intervención basado en reaprendizaje motor sobre la organización sensorial en adultos con hemiparesia

Investigadores: Claudia Patricia Henao Lema, Julio Ernesto Pérez Parra y Mónica Yamile Pinzón Bernal – Departamento de Movimiento Humano UAM.
Estudiantes Maestría en Neurorehabilitación, cohorte VIII

Ciudad y Fecha: Manizales, mayo de 2017

Fases y Procedimientos	Posibles riesgos a los que se exponen los participantes	Acciones que se implementarán para minimizar los riesgos	Acciones que se implementarán en caso que suceda un evento adverso	Referencias
Test de Organización Sensorial	Ídem	Ídem	Ídem	1, 2, 3 y 5
Programa de intervención fisioterapéutica basada en el reaprendizaje motor	Riesgo de caída Fatiga Riesgo cardiovascular Exacerbación de deficiencias	Desarrollar la intervención fisioterapéutica en espacios libres de obstáculos. Asegurar la buena iluminación del entorno donde se realizará la intervención. Evitar que el participante deambule en pisos que estén mojados.	Se suspenderá inmediatamente la sesión de tratamiento Se realizarán los primeros auxilios o cuidados paliativos Se remitirá la persona al servicio de urgencias o atención prioritaria de su EPS	1, 2, 3 y 6-10

		<p>Supervisión permanente al participante por parte del evaluador.</p> <p>Contar con profesionales debidamente entrenados en el manejo del programa de intervención.</p> <p>Asegurar el buen estado de los equipos, utensilios o herramientas con los que se llevará a cabo la intervención.</p> <p>Apego al programa de intervención.</p> <p>Modificación o suspensión del programa de intervención en caso de exacerbación de deficiencias.</p> <p>El participante debe estar siempre supervisado bien sea por el terapeuta o por un familiar.</p> <p>Las sillas deben tener una base de apoyo amplia, con una altura de asiento ajustable.</p> <p>Los pies del usuario deben estar apoyados y con una adecuada base de sustentación.</p> <p>Los usuarios que tengan alteración del equilibrio se recomienda el uso de un arnés.</p> <p>Se recomienda también el uso del cinturón Handi-Litf/walk o cinturón con asas.</p> <p>Para los trabajos en bipedestación se recomienda que el participante tenga un soporte o apoyo en el lado sano.</p>	<p>para que reciba el tratamiento adecuado.</p> <p>Se aplazará la intervención hasta contar con la autorización del médico tratante.</p> <p>Si pasadas dos semanas el participante no ha podido reanudar el tratamiento, según prescripción médica, se excluirá del estudio.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>Todas sesiones terapéuticas deben pasar por una base de calentamiento, donde se trabaja calistenia, estiramiento y ejercicios de amplitud de movimiento; se continúa con trabajo de ejercicio aeróbico y/o de fuerza y se termina con una fase de enfriamiento. Dedicar tiempo de la terapia al estiramiento muscular, realizar calentamiento previo.</p> <p>Realizar siempre retroalimentación visual y verbal al usuario.</p> <p>Verificar que usuario tengo una adecuada hidratación antes, durante y después de la terapia</p> <p>Es importante dosificar el ejercicio de acuerdo a las necesidades del participante.</p> <p>Tomar signos vitales antes, durante y después del ejercicio.</p> <p>Es importante darle tiempo de recuperación al participante entre ejercicio y sesiones terapéuticas.</p> <p>Tener siempre indicación médica para la realización de la terapia física.</p> <p>Supervisor que el participante haya tomado los medicamentos</p> <p>Explicar siempre el ejercicio que se va a realizar y hacer retroalimentación visual y verbal.</p>		
--	--	--	--	--

		Dar indicaciones y contraindicaciones de uso de los elementos terapéuticos		
Programa de intervención fisioterapéutica convencional	Ídem	Ídem	Debido a que el grupo control será intervenido por sus propios fisioterapeutas en el marco de una atención convencional, y no por investigadores del macroproyecto, las acciones para manejar una situación adversa durante el tratamiento estarán a cargo de los terapeutas tratantes.	1, 2, 3 y 11-12

Referencias bibliográficas del protocolo:

Feria L, Lugo B, Noriega L, Osorio A. Manual de seguridad del paciente para rehabilitación física (Informe Final de especialización). Ibagué: Universidad del Tolima, Colombia, 2012.

República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas (Versión 2.0). Recuperado de: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/prevenir-y-reducir-la-frecuencia-de-caidas.pdf>

Olvera S, Hernández A, Arroyo S, Nava M, Zapien M, Pérez M, Cárdenas P. Factores relacionados con la presencia de caídas en pacientes hospitalizados. *Revista de Investigación Clínica*. 2013; 65(1):88-93.

Tinetti ME. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. *J Am Geriatr Soc*. 1986; 34(2):119–26.

Podsiadlo D, Richardson S. (1991). The timed "Up & Go": a test of basic functional mobility for frail elderly persons. *J Am Geriatr Soc* 1991; 39(2):142-8.

Carr J, Shepherd RB. Ada L. Spasticity: research findings and implications for intervention. *Physiother* 1995;81(8):421-9.

Carr J, Shepherd RB. *Fisioterapia en los trastornos cerebrales - Guía clínica*. Buenos Aires: Médica Panamericana 1985.

Carr J, Shepherd RB. *Movement Science: Foundations for physical therapy in rehabilitation*. Maryland: Aspen Publications 1987.

Carr J, Shepherd RB. *Neurological Rehabilitation. Optimizing Motor Performance*. Oxford: Butterworth-Heinemann 1998.

Saeyns W, Vereeck L, Truijten S, Lafosse C, Wuyts FP, Van de Heyning P. Randomized controlled trial of truncal exercises early after stroke to improve balance and mobility. *Neurorehabilitation and Neural Repair*. 2012; 26(3):231–8.

Kim JH, Lee BH. Action observation training for functional activities after stroke: A pilot randomized controlled trial. *NeuroRehabilitation*. 2013; 33:565–74.

Ortega-Barrio MA, Herce-Martínez MB, Valiñas-Sieiro F, Mariscal-Pérez N, López-Cunquero MA, Cubo-Delgado E. Estudio del impacto del medio rural o urbano sobre la discapacidad residual tras un ictus. *Enferm Clin*. 2013;23(5):182-8.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES
FACULTAD DE SALUD
GRUPO DE INVESTIGACIÓN CUERPO - MOVIMIENTO
MAESTRÍA EN NEUROREHABILITACIÓN

INVESTIGACIÓN: EFECTO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN BASADO EN
REAPRENDIZAJE MOTOR SOBRE LA ORGANIZACIÓN SENSORIAL EN
ADULTOS CON HEMIPARESIA

Identificador en el estudio:	
------------------------------	--

VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS					
Ciudad y fecha:					
Nombres y Apellidos:					
Cedula ciudadanía:					
Dirección					
Teléfono fijo:		Teléfono celular:			
Edad (años):		Sexo:		0 Femenino	
Años de escolaridad:				1 Masculino	
Estado civil:		1 Soltero	Estrato socio-económico:		
		2 Casado			1 Estrato 1
		3 Divorciado			2 Estrato 2
		4 Viudo			3 Estrato 3
		5 Unión libre			4 Estrato 4
		9			5 Estrato 5
Situación laboral:		1 Empleado	A filiación a seguridad social en salud:		
		2 Independiente			6 Estrato 6
		3 Estudiante			9 No estratificado
		4 Jubilado			0 No afiliado
		5 Pensionado por invalidez			1 Subsidiado
		6 Desempleado (por la condición de salud)			2 Contributivo
		7 Desempleado (por otras causas)			3 Régimen especial
9	9				
		Observaciones:			

VARIABLES CLÍNICAS				
Edad de ocurrencia de la condición (años):		Diagnóstico Médico:	1	Enfermedad Cerebro Vascular
			2	Trauma Cráneo Encefálico
Tiempo de evolución de la condición (meses):			3	Tumor Cerebral
			4	Infección Cerebral
Observaciones:			9	
		Hemicuerpo comprometido:	1	Derecho
			2	Izquierdo

Nombres y apellidos del encuestador: _____

Firma del encuestador: _____

ANEXO 4 FORMATO EVALUACIÓN: TEST DE ORGANIZACIÓN SENSORIAL.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES
FACULTAD DE SALUD
GRUPO DE INVESTIGACIÓN CUERPO - MOVIMIENTO
MAESTRÍA EN NEUROREHABILITACIÓN



INVESTIGACIÓN: EFECTO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN BASADO EN REAPRENDIZAJE MOTOR SOBRE LA ORGANIZACIÓN SENSORIAL EN ADULTOS CON HEMIPRESIA

Identificador en el estudio:	
------------------------------	--

Ciudad y fecha:			
Nombres y Apellidos:			
Cedula ciudadanía:			
Teléfono fijo		Teléfono celular:	

TEST DE ORGANIZACIÓN SENSORIAL		
Equilibrio sobre superficie plana y ojos abiertos:		Segundos
Equilibrio sobre superficie plana y ojos cerrados:		Segundos
Equilibrio sobre goma de espuma fomy y ojos abiertos:		Segundos
Equilibrio sobre goma de espuma fomy y ojos cerrados:		Segundos

Observaciones:

Nombres y apellidos del evaluador: _____

Firma del evaluador: _____

“Efecto de un programa de intervención basado en reaprendizaje motor sobre organización sensorial en adultos con hemiparesia”

RECOMENDACIONES GENERALES

Tenga a mano los materiales requeridos: cronómetro, vendaje para los ojos (antifaz), espuma fomy de 45 x 45 y 15 cm de altura, colchoneta, tensiómetro, fonendoscopio y pulso-oxímetro. Utilice los mismos materiales para el pre-test y el pos-test.

Tanto el evaluador como el participante deben usar ropa cómoda.

El ambiente de evaluación para el pre-test y el post-test deben ser iguales, incluyendo la vestimenta del participante.

Monitoree los signos vitales del participante, suspenda la evaluación si se producen alteraciones importantes.

ANAMNESIS: VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS

Registre:

Ciudad y fecha donde se evalúa a la persona

Nombres y apellidos de la persona evaluada

Número de cedula de ciudadanía. En caso de contar con otro tipo de documento como cedula de extranjería o pasaporte, haga la claridad respectiva

Dirección y teléfonos fijo y celular

Datos socio-demográficos: edad, sexo, años de escolaridad, estado civil, estrato socio-económico, situación laboral y afiliación a seguridad social en salud. En el caso de estas dos últimas variables, registre en la casilla 9 otro valor no especificado en la encuesta.

Variables clínicas: diagnóstico médico que ocasionó la hemiparesia, hemicuerpo comprometido, edad de ocurrencia de la condición (años) y tiempo de evolución de la condición (meses).

No olvide registrar nombres y apellidos del encuestador y firmar el formato respectivo.

CONTROL POSTURAL¹

2.2 TEST DE ORGANIZACIÓN SENSORIAL

Instrucciones para el evaluador:

Las pruebas se realizan sin zapatos.

Entre prueba y prueba dejar descansar al participante

Ubíquese cerca de una pared no muy pegado y ponga un elemento diana o punto fijo en la pared para que sea observado.

Debe ubicar al participante en bípedo sobre superficie plana con pies tan juntos como pueda y brazos abajo a los lados del cuerpo, pídale que se sostenga durante 30 segundos contados con cronómetro.

Primero realice la prueba con ojos abiertos y luego con ojos cerrados.

Luego en igual posición pídale al participante que se pare sobre una colchoneta (goma de espuma fomy) y pídale que sostenga la posición de pie durante 30 segundos.

Primero realice la prueba con ojos abiertos y luego con ojos cerrados. Baja al participante de la colchoneta entre prueba y prueba.

Instrucciones para el participante:

Cuando yo le diga póngase de pie con los pies tan juntos como pueda con los brazos a los lados y sosténgase tanto tiempo como pueda y espere la orden de descansar.

Repita el ejercicio con los ojos cerrados.

Cuando yo le diga póngase de pie con los pies tan juntos como pueda sobre una colchoneta con los brazos a los lados y sosténgase tanto tiempo como pueda y espere la orden de descansar.

Repita el ejercicio con los ojos cerrados.

¹ Los ítems 2.1 a 2.4 son tomados y adaptados de: González-Marín AP, Naranjo-Aristizabal MM, Pinzón-Bernal MY. Efecto de un programa de ejercicios terapéuticos que involucran el componente axial en una situación tarea, sobre el control postural en ancianos que refieren inestabilidad. Manizales: Universidad Autónoma de Manizales. Proyecto de Investigación, 2009.

ANEXO 6 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN: GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL

GRUPO EXPERIMENTAL

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN BASADO EN LA PROPUESTA DE REAPRENDIZAJE MOTOR² (LINEAMIENTOS)

Los participantes asignados al grupo experimental recibirán un programa de intervención tres veces a la semana durante seis semanas para un total de 18 sesiones. Cada dos semanas se deberá incrementar el grado de dificultad de acuerdo a las características del individuo y aumentar el número de repeticiones. Recordar que no se trabajan series ni repeticiones, cada ejercicio debe ser realizado hasta alcanzar respuesta o en su defecto mínimo 5 minutos cada uno.

El entrenamiento incluye sesiones progresivas durante el programa iniciando con sesiones de 30 minutos hasta avanzar a sesiones de 60 minutos para las dos últimas semanas. Debido a que es un entrenamiento de alto nivel de exigencia se debe hacer monitorización de constantes vitales al inicio de cada sesión y al final.

Nota: Este programa se contraindica en personas con cualquier patología de origen cardiaco como angina inestable, falla cardiaca incontrolada, estenosis aortica severa, hipertensión arterial grado 3, hipotensión sintomática. Se contraindica además en momentos de presencia de fiebre, dolor, infección, taquicardia, diabetes con pobre control de la glicemia.

TRONCO Y MIEMBRO INFERIOR

² Programa de intervención basado en el modelo de reaprendizaje motor de Carr y Sherphard y bajo las recomendaciones clínicas e investigativas de Catherine Sherrington, Karl Shurr, Lois Ada y Ane Macklusley. Universidad de Sydney – Bankstown-Lidcombe Hospital, Bankstown, NSW, Australia.

Las secuencias de ejercicios se pueden encontrar en www.physiotherapyexercise.com

ASPECTO	MÚSCULOS PARALIZADOS Grado de 0 – 1	MÚSCULOS DÉBILES MUY DÉBILES Grado 2	MÚSCULOS DÉBILES Grado 3 – 4	MÚSCULOS FUERTES Grado 5
GENERALIDADES SOBRE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO	Para provocar la actividad muscular se requiere: Trabajar a favor de la gravedad. Disminuir la fricción. Promover la práctica mental. Trabajar contracciones concéntricas vs. excéntricas.	Trabajar con rangos completos de movimiento en lo posible desde rangos pequeños. Contracciones sostenidas. Variación en la velocidad de contracción. Ejercicios isométricos vs. excéntricos vs. concéntricos. Entrenar con múltiples repeticiones	Ejercicios resistidos: Se pueden usar theraband. Cargas libres con elementos en función. Cargas de peso	No es esencial
	Modificar la práctica de la tarea	Modificar la práctica de la tarea	Mantener la tarea durante el entrenamiento	Entrenar la tarea incrementando la flexibilidad y desarrollando estrategias cognitivas e incrementando la demanda física.
ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EN SUPINO	ACTIVACIÓN DE LA MUSCULATURA EXTENSORA: Actividades de prensa sobre un banco que debe empujar con el lado más afectado colocado bajo sus pies.	ACTIVACIÓN DE LA MUSCULATURA EXTENSORA: Se pueden hacer actividades iguales a las del grupo anterior, pero aumentando la carga de peso de empuje y el rango de desplazamiento.	ACTIVACIÓN DE LA MUSCULATURA EXTENSORA: Aumentar el grado de dificultad y empezar a trabajar sentado	No es esencial

	<p>Igual actividad con rodilla extendida y con rodilla flexionada.</p> <p>Aumentar la carga de peso verificando en una báscula digital.</p> <p>Actividades de prensa colocando banco debajo del pie que está por fuera de la cama.</p> <p>Extensión de la rodilla con la persona en decúbito lateral, permitiendo el estiramiento con una tabla o patín (scotter)</p> <p>Igual posición trabajar plantiflexión.</p>			
<p>AUMENTAR LA DESTREZA: TRASLADOS Y TRABAJO EN SENDENTE</p>	<p>Sentado con el apoyo completo del muslo y énfasis en el peso a través del pie afectado:</p> <p>Pared en el lado no afectado para alineación vertical, si es necesario. Pie completamente apoyado en el piso y aumentando la carga de peso, no permitir que se aumente la carga en el lado sano.</p>	<p>Sentado realizar diferentes alcances aumentando el grado de dificultad:</p> <p>Alcanzar hacia el lado afectado.</p> <p>Alcanzar hacia el lado no afectado.</p> <p>Alcanzar hacia adelante dentro de los límites de la estabilidad.</p> <p>Alcanzar objetos con diferentes pesos (botellas</p>	<p>Sentado realizar diferentes alcances, aumentar la carga de dificultad y aumentar la carga de peso en el pie más afectado</p>	<p>Realizar transferencia de aprendizaje hacia actividades de la vida cotidiana.</p>

	<p>Retroalimentar la carga de peso usando una báscula.</p> <p>Aumentar grados de dificultad usando diferentes niveles.</p> <p>Actividades de alcanzar objetos.</p> <p>Voltear y mirar hacia atrás</p>	<p>con agua, vasos, otros objetos)</p> <p>Mantener el objeto que alcanza.</p> <p>Aumentar la altura de la silla o disminuirla.</p> <p>Disminuir el soporte del muslo. (disminuir el punto de apoyo)</p>		
<p>PREPARACIÓN PARA TRANSFERENCIAS A BÍPEDO DESDE SUPINO Y SENTADO</p>	<p>Provocar la actividad del muslo:</p> <p>Decúbito lateral, arrastrar la extremidad inferior para permitir la flexión o la extensión de la rodilla.</p> <p>Empujar un bloque al final de la cama.</p> <p>Generar activación de los dorsiflexores con marcas para la movilidad</p>	<p>Empujar un bloque hasta el final de la cama.</p> <p>Extensión de la cadera al final de la cama.</p> <p>Flexión de rodilla sentado</p>	<p>Igual al anterior practicando con tareas complejas.</p> <p>Aumentar la carga de peso en el lado más afectado</p>	<p>No necesario</p>
<p>AUMENTAR LA DESTREZA: TRANSFERENCIA DE SEDENTE A BÍPEDO</p>	<p>Mover el pie afectado hacia atrás deslizando sobre el piso.</p> <p>Inclinar el tronco hacia adelante.</p> <p>Aumentar la carga de peso en el lado más afectado.</p> <p>Trabajar actividades de extensión</p>	<p>Aumentar el grado de dificultad de la tarea. Se puede colocar una mesa al frente para empezar a trabajar cargas de peso.</p> <p>Impulsarse y empezar a trasladarse hacia la bipedestación.</p> <p>Ponerse de pie haciendo apoyo sobre la mesa</p>	<p>Usar equipo para carga de peso.</p> <p>Material para facilitar contracción de flexores de cadera, dorsiflexores extensores de rodilla</p> <p>Subir y bajar un escalón de manera monitorizada</p> <p>Alcanzar y usar diferentes objetos durante la actividad.</p>	<p>Entrenamiento en habilidades para mejorar la flexibilidad y el desempeño en la tarea.</p> <p>De pie llevar un objeto en la mano.</p> <p>Pararse desde una silla inestable o desde una silla de ruedas.</p>

		Sentarse de manera correcta descargando todo el peso en el pie más afectado.		Pararse con máxima carga de peso en el lado más afectado. Pararse alcanzando un objeto simultáneamente por el lado más afectado. Pararse con el lado menos afectado sobre un <i>step</i> o bloque de madera.
ENTRENAMIENTO EN BÍPEDO	<p>ACTIVACIÓN DE MÚSCULOS EXTENSORES:</p> <p>Decúbito lateral flexo-extensión de rodilla con límites de movilidad. Decúbito lateral dorsiflexión de tobillo con topes demarcados. Decúbito lateral empujar un bloque hasta el borde de la cama hacia adelante. Se va aumentando el peso de empuje.</p> <p>PARA LA ABDUCCIÓN DE CADERA:</p> <p>En supino reducir la fricción con la camilla, usando un monopatín.</p>	<p>PARA MÚSCULOS EXTENSORES:</p> <p>Empujar un bloque al final de la cama en decúbito supino. Extensión de la cadera empujando un bloque con extremidad inferior fuera de la camilla. Tener en cuenta el peso desplazado.</p> <p>PARA MÚSCULOS ABDUCTORES:</p> <p>En supino promover la abducción en contra de resistencias de diferentes categorías. Aumentar el grado de dificultad</p>	<p>IGUAL QUE EL PUNTO ANTERIOR</p> <p>Aumentar grados de dificultad</p>	Igual al anterior y aumentar el grado de dificultad trabajado dentro y fuera de los límites de la estabilidad.

	Trabajar con topes. Trabajar rotaciones con topes			
ENTRENAMIENTO DE LA DESTREZA EN BÍPEDO	Entrenamiento de sentarse hacia el lado más afectado. Empujar diferentes tipos y topes de niveles en decúbito supino.	Modificar la tarea. Intentar sentarse en diferentes ángulos y volver. Ponerse de pie con asistencia mínima Ponerse de pie	Pararse y alcanzar objetos de diferentes tamaños y pesos a diferentes niveles de altura. Trabajar inicialmente con los límites de la estabilidad y salir de ésta si es posible. Cargar peso sobre el lado más afectado mientras de pie se realizan actividades de destreza en el lado sano. Ejercicios de pararse en punta de pies Ejercicios de dar un paso sobre el escalón volver	Cambios de base de soporte y aumentar la velocidad en la tarea, el tiempo y el grado de dificultad.

ENTRENAMIENTO DEL EQUILIBRIO

EQUILIBRIO EN BÍPEDO Y SENTADO	OBJETIVO
Elevar el pie menos afectado con mínimo soporte	Mejora la coordinación y rendimiento cardiovascular
Elevar el pie a un banco y cambiar de niveles soporte (hacerlo primero en lado menos afectado)	
Con pies tan juntos como se pueda ejercicios de semi-tandem	Coordinación y disminución de la base de sustentación
Pararse sobre un pie	
Mantener la posición durante un buen rato	
Hacer la misma actividad con ojos cerrados	
Trabajar sobre diferentes superficies	
Alcanzar estando de pie	Mejorar la coordinación

De pie con base de sustentación estrecha, pies sobre un banco, pie menos afectado sobre diferentes superficies, alcanzar objetos a diferentes niveles y alturas.	Práctica para la bipedestación y la marcha
Dar pasos hacia diferentes direcciones y sobre diferentes tipos de bancos o <i>steps</i>	
Caminar con diferentes bases de soporte	
Caminar con objetos en la mano	
Caminar realizando una tarea dual o compleja	
Caminar de lado	Práctica para la bipedestación y la marcha
Pararse - sentarse: iniciando con una mesa al frente, luego sin mesa, con silla con descansa brazos avanzando a una silla sin descansa brazo. Repetir entre 10 a 15 veces como mínimo durante cada sesión.	
Pararse en punta de pies: Primero recostado contra la pared Luego fuera de la pared Recostado contra la pared con pies sobre una cuña de madera Punta de pies parado en la pierna menos afectada primero en piso plano y luego sobre la cuña de madera. Repetir de 10 a 15 veces.	Coordinación, fuerza muscular y capacidad aeróbica
Equilibrio sentado: Actividades combinando miembros superiores Actividades de implicación vestibular con ojos cerrados y abiertos	
En todas las posiciones trabajar alcance y agarre	
Paso al frente y regresa: aumentar el grado de dificultad	

ENTRENAMIENTO DE MIEMBRO SUPERIOR

ASPECTO	MÚSCULOS PARALIZADOS Grado de 0 – 1	MÚSCULOS DÉBILES Grado 2	MUY DÉBILES Grado 3 – 4	MÚSCULOS FUERTES Grado 5
GENERALIDADES SOBRE	Para provocar la actividad muscular se requiere: Trabajar a favor de la gravedad.	Trabajar con rangos completos de movimiento en lo posible desde rangos pequeños.	Ejercicios resistidos: Se pueden usar theraband. Cargas libres con elementos en función.	No es esencial

ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO	Disminuir la fricción. Promover la práctica mental. Trabajar contracciones concéntricas vs. excéntricas.	Contracciones sostenidas. Variación en la velocidad de contracción. Ejercicios isométricos vs. excéntricos vs. concéntricos. Entrenar con múltiples repeticiones	Cargas de peso	
ENTRENAMIENTO EN SUPINO	Llevar la mano más afectada con ayuda de la mano sana hacia la boca, cara, nariz, hombro.	Trabajar con topes abducción y aducción.	Aumentar el grado de dificultad	
ENTRENAMIENTO EN DECÚBITO LATERAL	Sobre el lado menos afectado y brazo sobre un monopatín o sobre un <i>scotter</i> hacer flexo-extensión del hombro con topes. Iniciar desde rangos cortos de movimiento hacia rangos más grandes	Igual al punto anterior, aumentando el grado de dificultad.	Envolviendo el codo con un inmovilizador o usando una caja hacer ejercicios de protrusión del hombro para facilitar la acción del músculo serrato anterior. Llevar brazo hacia adelante llegando hacia una meta	
SENTADO	Sentado lado menos afectado contra la pared para mantener el equilibrio, base de sustentación adecuada y demarcada en miembros inferiores hacer alcances de objetos dispuestos sobre una mesa hacia adelante	Igual al anterior, pero además alcanzar objetos que se encuentran dispuestos en una mesa más baja, al lado derecho y hacia el lado izquierdo. Aumentar el grado de dificultad. Ejercicios de protrusión de hombro con y sin codo bloqueado con inmovilizador. Alcanzar una meta dispuesta	Igual a las actividades anteriores promoviendo la acción en contra de la gravedad y aumentando el grado de dificultad. Implementar el uso de la mano con actividades como activación de la fuerza de dedos con uso de pinzas para depilación, presión de objetos.	Generar transferencia del aprendizaje

		<p>sobre la mesa con un objeto agarrado y sujetado con cinta. Igual se puede realizar promoviendo la flexo-extensión del codo.</p> <p>Sentado en frente de una mesa inclinar el tronco hacia diferentes niveles mientras se alcanza un objeto que está sobre la mesa en frente.</p> <p>Sentado al lado más afectado y brazo soportado sobre un scotter o monopatín hacer ejercicios de flexo-extensión de codo con el brazo.</p> <p>Igual al anterior hacer ejercicios de flexo-extensión del hombro.</p> <p>Equilibrio sentado, hacer transferencias de objetos de un lado a otro sobre líneas curvas demarcadas.</p> <p>Sentado frente a la mesa con líneas demarcadas promover la flexo-extensión de la muñeca con topes hacia ambos lados</p>	<p>Con una botella llena de agua a diferentes niveles con una tapa perforada hacer presión para sacar el líquido.</p> <p>Usar botellas de diferentes tamaños y medidas de líquidos para hacer ejercicios de flexo-extensión del codo y flexo-extensión del hombro.</p> <p>Ejercicios de flexo-extensión de la muñeca con topes de pitillos plegables</p>	
BIPEDO			<p>Contra la pared con un marcador demarcar recorridos de flexo-</p>	<p>Transferencia del aprendizaje en casa</p>

			extensión de hombro y de abducción y aducción. Alcance de objetos dispuestos en una mesa al frente, en una estantería más alta. Tomarla de un lugar más bajo.	
--	--	--	---	--

MATERIALES REQUERIDOS:

Cinta aislante o de pintor Regla para medir Marcadores Papel periódico Cronómetro Silla con apoyabrazos	Silla sin apoya brazos Thera-band amarillo y rojo de 2 metros Tapete antideslizante Vasos de icopor Baja lenguas Caja de cartón	Botellas pet de diferentes dimensiones Pitillos plásticos plegables o con fuelles Palos de madera (2) Objetos diversos Cuchara, tenedor Pinza de delipar	Monedas. Monopatín o scotter Contador Bloque de madera Steps Bloques de madera de diferentes dimensiones Cuñas de madera
--	--	---	--

GRUPO CONTROL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CONVENCIONAL

Las personas asignadas al grupo control recibirán tratamiento de fisioterapia tradicional ambulatoria adaptada a las condiciones específicas de su alteración clínica y su condición motriz por parte de un fisioterapeuta que nada tiene que ver con el ensayo clínico. Las sesiones de terapia tradicional están basadas en propuestas para promover el control postural, la condición física, la competencia para caminar y procesos de *hands on* para mejorar la alineación. En el grupo de terapias denominadas convencionales se incluyen todas las que se asocian con un principio sensoriomotriz y de facilitación como el concepto Bobath, método de Kabat, ejercicio terapéutico y Brunnstrom.

El tiempo estipulado son 18 sesiones realizadas durante 6 semanas, tres veces por semana, e igualmente todos los participantes deben cumplir con los criterios de inclusión.